

Saber é poder agir,

SIDA ?

Sida Info Service : 0800 840 800

Chamada anónima e gratuita 24h por dia

Minitel 3611

Teclé "sida" e o número ou o nome do seu departamento

www.sante.gouv.fr

Rubrica "les dossiers" seleccione "sida"

Sida Info Droit : 0 810 636 636

Chamada anónima ao custo de uma chamada local

Info Migrants : 01 45 35 90 00



Le sida
n'est
pas
mort.



www.cfes.sante.fr

DDB & Co. - RCS Paris B 317 866 465 - Juin 2001 - R.É. : 13-01-547-IE

SIDA

O teste,
quando houver dúvida...

Portugais

Este documento traduzido em várias linguas por ISM Traduction (Telef. : 01 43 56 20 50) é editado e difundido gratuitamente a pedido e por escrito ao CFES (2, rue Auguste Comte - BP51-92174 Vanves Cedex - Fax 0: 01 41 33 33 91)

O teste

manual de instruções

O que é um teste de detecção ?

Um exame de sangue basta para detectar a presença do vírus da sida (VIH) no organismo. É uma decisão livre e voluntária.

Pode-se fazer o teste :

- numa consulta de detecção anónima e gratuita (CDAG); a consulta e o teste são gratuitos;
- em certos centros de planeamento e de educação familiar; a consulta e o teste são gratuitos;
- num laboratório de análises; o teste é 100 % reembolsado pela segurança social se tiver sido receitado por um médico.

VIH : Virus de Imunodeficiência Humana
CDAG : Consulta de detecção anónima e gratuita

Porqué fazer um teste de detecção ?

> Conhecer o resultado do teste de detecção permite beneficiar o quanto antes de assistência médica.

Hoje em dia, existem medicamentos eficazes que permitem retardar a evolução da infecção.

Nunca é tarde para tratar-se. Pode-se fazer um teste mesmo se tomou-se um risco há tempos.

> Conhecer o resultado do teste também permite saber se é necessário utilizar um preservativo para proteger seu, sua ou seus parceiros.

o resultado do teste só é válido para si próprio.
Cada parceiro deve fazer o seu próprio teste.

Quando fazer um teste de detecção ?

Se correu um risco :

- teve uma relação sexual sem preservativo com uma pessoa da qual não sabe se é soronegativa.
- o preservativo rasgou-se ou deslizou durante a relação sexual.
- partilhou material de injeção durante o uso de drogas.

Se deseja abandonar o uso de preservativos :

- tem uma relação estável e quer deixar de usar o preservativo
- deseja ter filhos.

> Consulte um médico numa consulta de detecção anónima e gratuita (CDAG) ou seu próprio médico.

- Quinze dias após a tomada de risco a pessoa pode saber se foi contaminada pelo vírus da sida.
- Somente 3 meses depois da tomada de risco é que a pessoa pode ter certeza de não ter sido contaminada pelo vírus da sida.

> Se você for soropositivo, um médico o acompanhará periodicamente e poderá, se necessário, lhe propor um tratamento.

Soronegativo = não contaminado pelo vírus da sida
Soropositivo = contaminado pelo vírus da sida

Se correu um risco há menos de 48 h :

> Dirija-se o quanto antes ao setor de emergência de um hospital, junto com seu (sua) parceiro(a) se possível, para um tratamento que poderá evitar a contaminação.

Onde fazer um teste de detecção ?

Existe pelo menos um centro de detecção anónima e gratuita (CDAG) por departamento.

Para conhecer o endereço do CDAG mais próximo:

Sida Info Service : 0800 840 800

Chamada anónima e gratuita 24h por dia

Minitel 3611

Tecele "sida" e o número ou o nome do seu departamento

www.depistagesida.com

Custeio

Qualquer que seja sua situação administrativa com relação ao visto de permanência e de trabalho, qualquer pessoa a viver habitualmente em França pode ter acesso a um teste de detecção da sida anónimo e gratuito, e se preciso beneficiar de acompanhamento e tratamento médico.

Sida Info Droit : 0810 636 636

Chamada anónima ao custo de uma chamada local

Info Migrants : 01 45 35 90 00