

NILIREX[®]

Fungicida para el control preventivo y curativo de Botrytis, Sclerotinia y Monilia. Impide eficazmente la germinación de las esporas y bloquea el crecimiento del micelio.



APLICACIONES AUTORIZADAS

Tratamientos fungicidas preventivos y curativos en cultivos de:

Ajos, cebolla, cucurbitáceas, chalote, endibia, escarola, fresales, guisantes verdes, judías verdes, lechuga y solanáceas (pimiento, tomate, berenjena...) excepto tabaco: contra botritis y esclerotinia

Albaricoquero, almendro, ciruelo, melocotonero y nectarino: contra monilia.

Arbustos ornamentales, frambueso, kiwi, ornamentales herbáceas y vid: contra botritis.

Peral: contra stemfilium.

Composición	Procimidona 50% p/p (500 g/Kg)
Formulación	Polvo Mojable (WP)
R.O.P.M.F. n°	13.864
Envasado	1 Kilo (2 x 500 g)
Clasificación	Nocivo (Xn), Peligroso para el Medio Ambiente (N) Mamíferos: A Aves: A Peces: A Peligrosidad controlable para abejas.

DOSIS Y MODO DE EMPLEO

Aplicar en pulverización normal a dosis del 0,1% (100 gramos en 100 litros de agua), excepto en peral, que se aplicará a dosis de 0,1 - 0,15% (100-150 gramos en 100 litros de agua).

PLAZO DE SEGURIDAD

15 días en kiwi, peral y vid. 5 días en los demás cultivos. No procede plazo de seguridad en arbustos ornamentales y ornamentales herbáceas.

OBSERVACIONES

Actúa tanto de modo preventivo como curativo. Uso de forma preventiva evita la infección de los cultivos. En tratamientos curativos, aplicar al aparecer los primeros síntomas de la enfermedad.