

COLPOTROFÍN[®] crema vaginal

P R O M E S T R I E N O

PROPIEDADES

Colpotrofín[®], concebido exclusivamente para administración local, restaura el trofismo de los tegumentos (piel, mucosa) del aparato genital femenino, sin producir efectos estrógenos en los órganos vecinos (útero), o a distancia (mamas, hipófisis, etc.).

Esta acción trófica se obtiene fundamentalmente por las especiales particularidades del promestrieno, cuya actividad se ejerce sólo a nivel tópico, sin los efectos estrógenos sistemáticos citados.

INDICACIONES

Trastornos atróficos de la vulva, del vestíbulo y del anillo vaginal.

La eficacia de la crema de **Colpotrofín[®]** se sitúa entre el 67 y el 88 por 100 de los casos (a excepción de la kraurosis donde los resultados positivos se dan en el 33 por 100).

CONTRAINDICACIONES

No se conocen.

EFFECTOS SECUNDARIOS E INCOMPATIBILIDADES

En la experiencia disponible no se han presentado efectos secundarios. Puede asociarse a cualquier otra terapéutica por vía oral o parenteral.

MODO DE EMPLEO Y POSOLOGÍA

- Una o dos aplicaciones al día de la cantidad de crema necesaria para cubrir la superficie a tratar, seguida de ligero masaje.

- En los casos en que se considere conveniente la aplicación intravaginal de la crema, se utilizará a tal fin el aplicador especial que contiene el envase, cargándolo directamente del tubo, a cuya boca se ajusta, hasta el tope permitido por el aplicador, sin forzarlo, y que corresponde a un gramo de crema. Una vez cargado se introducirá en la vagina a la profundidad deseada, inyectando dicha dosis mediante presión del émbolo. La aplicación intravaginal de la crema podrá

efectuarse, según los casos, dos o tres veces al día, siendo aconsejable que una de las dosis sea administrada por la noche antes de acostarse.

Una vez utilizado el aplicador, éste deberá ser lavado con agua para su mejor conservación y uso sucesivo.

Se hacen necesarias curas de sostenimiento si la causa primera del trastorno persiste (menopausia, castración, tratamientos anticonceptivos con estrógenos-progestágenos) o si el efecto yatrogénico es duradero (irradiaciones).

INTOXICACIÓN Y SU TRATAMIENTO

No se conocen efectos tóxicos con la aplicación tópica de **Colpotrofin**[®] crema vaginal. En caso de sobredosis o ingestión accidental, consultar al Servicio de Información Toxicológica. Teléfono 91 562 04 20.

PRESENTACIÓN Y COMPOSICIÓN

Crema Vaginal - Envase de 30 g de crema conteniendo por 100 gramos :

Promestrieno1,0 g

Excipientes: cutina, cetiol, miritol, glicerol, eumulgin, parahidroxibenzoato de metilo sal de sodio (E-219), parahidroxibenzoato de propilo sal de sodio (E-217) y agua purificada c.s.p. 100 g.

CON RECETA MÉDICA

**LOS MEDICAMENTOS DEBEN MANTENERSE FUERA
DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS**

Merck Farma y Química, S.A.
Polígono Merck
08100 Mollet del Vallés
(Barcelona)

MERCK

NT1CLD00005F018