

# Mencalisvit<sup>®</sup> polvo



## Sobres - Vía oral

### Composición

Cada sobre de 5 g contiene:

|   |          |
|---|----------|
| Calcio, lactato .....                   | 1,9 g    |
| equivalente a 350 mg de Calcio elemento |          |
| Colecalciferol (DCI) .....              | 200 U.I. |
| Sacarosa (aprox.) .....                 | 2,5 g    |
| Sacarina sódica .....                   | 7 mg     |

Otros excipientes: Dióxido de titanio, esencia de fresa y colorante rojo (E-124), c.s.

### Propiedades

MENCALISVIT es un preparado que contiene como principios activos Calcio en forma de Lactato cálcico, asociado a Vitamina D en forma de Colecalciferol.

El Calcio, con acción osteogénica, favorece el crecimiento óseo y se utiliza en los trastornos por descalcificación en general y en estados carenciales. El Colecalciferol, posee propiedades antirraquíticas y es un regulador del metabolismo del Calcio.

### Indicaciones

Todos los estados, agudos o crónicos, que cursan con descalcificación, en especial la osteoporosis.

En las carencias cálcicas o en las necesidades aumentadas de calcio: retrasos del crecimiento, raquitismo, fracturas óseas, hipocalcemia, tetania, embarazo y lactancia.

### Posología

Según prescripción facultativa y patología a tratar.

Posología recomendada:

Niños: 1-2 sobres al día.

Adultos: 2-4 sobres al día.

Administrar preferiblemente durante las comidas.

### Modo de empleo

Desleír, agitando, el contenido de un sobre en medio vaso de agua. Se formará una suspensión de ligero color rosado.

### Contraindicaciones

Hipersensibilidad a alguno de los componentes. Hipercalcemia. Calciuria. Insuficiencia renal grave.

### Precauciones

Evitar administrar dosis superiores a las recomendadas durante el embarazo y a niños pequeños.

Debe evitarse la administración simultánea de preparados que contengan altas dosis de vitamina D.

### Advertencia

Cada sobre de este medicamento contiene unos 2,5 g de sacarosa, lo que deberá ser tenido en cuenta por los enfermos diabéticos.

*Importante para la mujer:*

Si está usted embarazada o cree que pudiera estarlo, consulte a su médico antes de tomar este medicamento. El consumo de medicamentos durante el embarazo puede ser peligroso para el embrión o el feto y debe ser vigilado por su médico.

### Interacciones

El Calcio aumenta la toxicidad de la digital pudiendo provocar intoxicación.

Por vía oral, el Calcio puede disminuir la absorción de tetraciclinas. Espaciar 2 horas la administración.

### Efectos secundarios

Puede ocasionar náuseas, vómitos, diarreas.

**Intoxicación y su tratamiento**

No se conocen casos de intoxicación con el preparado.

En caso de sobredosificación, el tratamiento es sintomático: lavado de estómago. Mantener al paciente en posición horizontal.

En caso de sobredosis o ingestión accidental, consultar al Servicio de Información Toxicológica. Teléfono (91) 562 04 20.

**Presentación**

Caja con 30 sobres monodosis de 5 g.

**Sin receta médica**

**Los medicamentos deben mantenerse fuera  
del alcance de los niños**

**LABORATORIOS MENARINI, S.A.**

Alfonso XII, 587 - Badalona (Barcelona) - ESPAÑA