

Makes  
up to **42 Gallons**

GUARANTEED  
RESULTS<sup>†</sup>

**Spectracide®**

# CARPENTER ANT & TERMITE KILLER

Insecticida concentrado para  
hormigas carpinteras y termitas

Insect Spray Concentrate<sub>3</sub>

**Kills Wood-Destroying Insects!**

as listed

For Use Around Foundations,  
Porches, Wood Piles,  
Wooden Fences  
& Decks



ESPAÑOL

VEA EL REVERSO

For Outdoor Use Around the Home Only.

Active Ingredient:

Lambda-Cyhalothrin ..... 0.38%

Other Ingredients ..... 99.62%

KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN

**CAUTION** See back booklet for additional  
precautionary statements.

**KILLS ON CONTACT**

†For terms of guarantee, see back panel.

MANTÉNGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

PRECAUCIÓN Consulte el folleto en la parte posterior

para conocer las precauciones adicionales.

Net 32 fl oz  
(1 qt / 946 mL)



17-12458

Mix  
With  
Water

PEEL HERE  
STOP  
READY  
ENTIRE LABEL  
BEFORE USE.

**Spectracide**

ABRA AQUÍ ALTO. LEA TODA LA  
ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO.

# CARPENTER ANT & TERMITE KILLER

Insecticida concentrado para  
hormigas carpinteras y termitas

Insect Spray Concentrate<sup>3</sup>

## PRODUCT FACTS

### What It Does:

Kills Carpenter Ants, Termites\*, Carpenter Beetles and Other Wood-Destroying Pests as Listed

### Where To Use:

Outdoors Around Foundations, Outside Buildings, Porches, Wood Piles, Wooden Fences and Decks

### Questions & Comments:

Call 1-800-917-5438 or visit our website at [www.spectracide.com](http://www.spectracide.com)



### GUARANTEED RESULTS OR YOUR MONEY BACK

If you are not satisfied with this product for any reason, send your written request for a refund to the address below, together with the original dated store receipt showing the price you paid. Please allow 6-8 weeks for processing.

MADE IN THE  
**USA**

Distributed by Spectrum Group  
Division of United Industries Corporation  
PO Box 142642, St. Louis, MO 63114-0642

EPA Reg. No. 9688-260-8845  
EPA Est. Nos. 9688-MO-1 (1), 39754-WI-1 (2),  
39609-MO-1 (3), 79533-WI-1 (4)  
Circled letter is first letter of lot number.  
17-12459 © 2007 UIC

\*FOR LOCALIZED CONTROL ONLY.

PROOF OF PURCHASE

FPO UPC  
0 71121 95677 4

NOTICE: Buyer assumes all responsibility for safety and use not in accordance with directions.

NOTA: El comprador asume toda la responsabilidad en caso de no seguir las instrucciones sobre seguridad y modo de empleo.

**STOP READ ENTIRE LABEL BEFORE USE.**

## DIRECTIONS FOR USE

It is a violation of Federal law to use this product in a manner inconsistent with its labeling.

 **Keep people and pets off treated areas until spray has dried.**

In New York State, this may not be applied to lawns within 100 ft of a coastal marsh, or stream that drains into a coastal marsh.

### OUTDOORS TO CONTROL WOOD-DESTROYING INSECTS

Mix 10 fl oz with enough water to make one gallon.

Treat infested areas and areas likely to be infested, such as wood surfaces, voids and tunnels in damaged wood, behind veneers, in structural voids (between stud walls and spaces between wood and foundations), along cracks, along crawl spaces and around outside buildings, porches, wood piles, wooden fences and decks. Kills exposed subterranean termites\*, dampwood termites\*, drywood termites\*, carpenter ants, ambrosid beetles, death hunter beetles, false powderpost beetles and powderpost beetles.

### PESTS OUTSIDE THE HOME

Mix 0.75 fl oz (1½ Tbsp) in one gallon of water and apply as a continuous band of insecticide around building foundation and around windows, doors, eaves, vents and other areas to greatly reduce the potential for entry by crawling pests. For easier application, remove debris and leaf litter from next to the foundation, cut back vegetation and branches that touch the foundation, and move or rake back rocks, deep mulch, or other potential pest harborage next to the foundation. Apply a 3 ft band around the structure and upwards along the foundation to 3 ft and around windows, doors and roof overhangs. Apply as a coarse spray to thoroughly and uniformly wet the foundation and/or band area so that the insecticide will reach the soil or thatch level where pests may be active. One gallon will treat 250 sq ft of surface area. Repeat application every eight weeks.

**OUTDOOR SURFACES USE:** For control of ants\*\*, centipedes, cockroaches, crickets, fleas, millipedes, mosquitoes, palmetto bugs, scorpions, sowbugs, pillbugs, spiders, deer ticks and waterbugs. Mix 0.75 fl oz (1½ Tbsp) in one gallon of water and apply as a residual treatment to ornamental plants next to foundations of buildings and to surfaces of buildings, porches,

screens, window frames, eaves, patios, garages and other similar areas where these pests are active. Repeat application every eight weeks.

*Note: This product is non-staining to most home siding depending on age and cleanliness. However, before using in areas where the spray can contact home siding (vinyl siding in particular), test in an inconspicuous area and recheck in a few hours. Do not use if any staining is observed.*

### LAWNS

#### HOW TO MIX AND APPLY

**STEP 1: Determine size of spraying job.** Measure the area to be sprayed. Make applications when insects first appear. Applications should be repeated only as directed to maintain control.

**STEP 2: Use a clean sprayer.** Carefully measure and mix the amount of product and water as indicated in the directions. It is always a good idea to wear gloves when handling pesticides. Kitchen utensils such as measuring cups and measuring spoons should not be used for food purposes after use with pesticides.

**STEP 3: Spray** as directed. Thorough coverage is important.

**STEP 4: Flush sprayer with clean water after each use.**

**UNDERGROUND INSECTS/THATCH-INFESTING INSECTS** including bluegrass billbugs (adults), black turfgrass Ataenius (adults), chiggers, chinch bugs, white grubs (Japanese beetles, European chafer, Southern chafer), dung beetles and hyperodes weevils (adults), European crane flies and mole crickets (nymphs and young adults). Mix 0.75 fl oz (1½ Tbsp) in one gallon of water to treat 125 sq ft or 6 fl oz in eight gallons of water to treat 1,000 sq ft. For subsurface insect control (mole crickets, grubs) water treated area with additional ¼ to ½ inch of water for optimum results.

**SURFACE INSECTS** including ants\*\*, armyworms, crickets, cutworms, earwigs, fleas, lawn moths ( sod webworms ), millipedes, sowbugs, mites, spittlebugs, deer ticks (which may transmit Lyme Disease). Thoroughly wet down grass a few hours before applying. Mix 0.75 fl oz (1½ Tbsp) in one gallon of water to cover 250 sq ft or 3 fl oz (6 Tbsp) in four gallons of water to cover 1,000 sq ft of lawn. Delay additional watering or mowing for 24 hours after application for optimum control of surface insects. For heavy infestations use rate can be increased to 4.5 fl oz/ 1,000 sq ft.

**WHEN TO TREAT:** Treat the following pests during the months indicated or when first noticed.

JAN	FEB	MAR	APR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEP	OCT	NOV	DEC
			Billbugs				Grubs				
		Dung beetle grubs									
			Hyperodes weevils								

Treat ants\*\* and other insects when they first appear or you notice lawn damage.

\*For localized control only. The purpose of such applications of this product for termites is to kill workers or winged reproductive forms that may be present in treated channels at the time of treatment. Such applications are not a substitute for mechanical alteration, soil treatment or foundation treatment but are merely a supplement. This product is not recommended as sole protection against termites. For active termite infestations, get a professional inspection.

\*\*Argentine, southern, field, Allegheny mound, Florida carpenter, cornfield, honey, pavement, nuisance.

## STORAGE AND DISPOSAL

**Storage:** Store in a cool, dry area away from heat or open flame.

**Disposal: If empty:** Do not reuse this container. Place in trash or offer for recycling if available.

**If partly filled:** Call your local solid waste agency for disposal instructions. Never place unused product down any indoor or outdoor drain.

## PRECAUTIONARY STATEMENTS

### Hazards to Humans and Domestic Animals

**CAUTION.** Harmful if swallowed. Causes moderate eye irritation. Avoid contact with skin, eyes or clothing. Wash thoroughly with soap and water after handling and before eating, drinking, chewing gum or using tobacco. Food utensils such as measuring cups and tablespoons must not be used for food purposes after use in measuring pesticides.

### First Aid

**If swallowed:** Call a Poison Control Center or doctor immediately for treatment advice. Have person sip a glass of water if able to swallow. Do not induce vomiting unless told to do so by a Poison Control Center or doctor. Do not give anything by mouth to an unconscious person.

**If in eyes:** Hold eye open and rinse slowly and gently with water for 15-20 minutes. Remove contact lenses, if present, after the

first 5 minutes, then continue rinsing eye. Call a Poison Control Center or doctor for treatment advice.

Have the product container or label with you when calling a Poison Control Center or doctor, or going for treatment.

## Environmental Hazards

This pesticide is extremely toxic to fish. Do not contaminate water when disposing of equipment washwaters. Do not apply directly to water. Drift and runoff from treated areas may be hazardous to aquatic organisms in neighboring areas.

This product is highly toxic to bees exposed to direct treatment or residues on blooming crops or weeds. Do not apply this product or allow it to drift to blooming crops or weeds if bees are visiting the treatment area.

**NOTICE: Buyer assumes all responsibility for safety and use not in accordance with directions.**

**Questions & Comments?** Call 1-800-917-5438 or visit our website at [www.spectracide.com](http://www.spectracide.com)



LEA TODA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO.

## MODO DE EMPLEO

Se considera una violación a la ley federal usar este producto con otros fines que los indicados en la etiqueta.



Mantenga a las personas y a las mascotas fuera de las áreas tratadas hasta que el rocío se haya secado.

En el Estado de Nueva York, no se podrá aplicar en áreas de césped ubicadas a una distancia de hasta 100 pies de un pantano o de un arroyo que desemboca en un pantano costero.

## AL AIRE LIBRE PARA CONTROLAR INSECTOS QUE DESTRUYEN LA MADERA

Mezcle 10 onzas líquidas con agua suficiente para completar un galón. Trate las áreas infestadas y las que puedan llegar a infestarse, tales como superficies de madera, espacios vacíos y túneles en la madera dañada, detrás de enchapados de madera, en espacios vacíos estructurales (entre paredes sobre montantes y espacios entre la madera y los cimientos); a lo largo de rajaduras, en espacios para ventilación ("crawl space") y alrededor de edificaciones exteriores, porches, pilas de leña, cercas de madera y plataformas de madera. Mata a las termitas subterráneas\*, las termitas de madera húmeda\*, las termitas de madera seca\*, las hormigas carpinteras, y diversos tipos de escarabajos ("ambrosid", "death hunter", escarabajos "falsos" de la viruta y escarabajos de la viruta) que se exponen al producto.

## INSECTOS NOCIVOS FUERA DEL HOGAR

Mezcle 0.75 onzas líquidas (1½ cda. sopera) en 1 galón de agua y aplique una franja continua de insecticida alrededor de los cimientos del edificio y de las ventanas, puertas, aleros, respiraderos y otras zonas para reducir en gran medida la posibilidad de que ingresen insectos nocivos rastreados. Para que la aplicación sea más fácil, quite los escombros y las hojas secas de la zona próxima a los cimientos, corte y retire la vegetación y las ramas que estén en contacto con los cimientos, y mueva o rasifique las rocas, el abono orgánico u otros posibles reservorios de insectos nocivos próximos a los cimientos. Aplique una franja de 3 pies alrededor de la estructura, desde abajo hacia arriba, a lo largo de los cimientos hasta alcanzar una altura de 3 pies, y alrededor de las ventanas, puertas y salientes del techo. Aplique como rocío grueso a efectos de mojar bien y de manera uniforme los cimientos, la zona de la franja o ambos, de modo que el insecticida llegue hasta el suelo o hasta el nivel del quinchado donde los insectos nocivos pueden estar activos. Con un galón se puede tratar una superficie de 250 pies cuadrados. Repita la aplicación cada ocho semanas.

**USO EN SUPERFICIES EXTERIORES:** Para el control de hormigas\*\*, ciempiés, cucarachas, grillos, pulgas, milpiés, mosquitos, cucarachas de caño, alacranes, cochinillas de la humedad, cochinillas, arañas, garrapatas de los venados y chinches de agua. Mezcle 0.75 onzas líquidas (1½ cda. sopera) en 1 galón de agua y aplique como tratamiento de acción residual a plantas ornamentales próximas a los cimientos de edificios y a las superficies de edificios, porches, mosquiteros, marcos de ventanas, aleros, patios, cocheras y otras zonas similares donde pueda haber actividad de estos insectos nocivos. Repita la aplicación cada ocho semanas.

*Nota: Este producto en general no mancha la mayoría de los revestimientos del hogar, dependiendo de la antigüedad y limpieza de los mismos. No obstante, antes de utilizarlo en áreas donde el rocío pueda entrar en contacto con el revestimiento del hogar, (en particular con revestimientos vinílicos) pruébelo en un lugar que no sea muy visible y verifique su efecto unas horas más tarde. No lo utilice si observa manchas.*

## CÉSPEDES

### CÓMO MEZCLAR Y APlicAR

PASO 1: **Defina la magnitud de la tarea de rocío a realizar.** Mida el área a rociar. Realice aplicaciones en cuanto aparezcan los insectos por primera vez. Sólo se debe repetir el tratamiento de acuerdo a las indicaciones, con la finalidad de mantener la plaga bajo control.

PASO 2: **Use un rociador limpio.** Mida cuidadosamente y mezcle la cantidad de producto y de agua como se indica en las instrucciones. Es siempre recomendable usar guantes al manipular pesticidas.

**No deben utilizarse utensilios de cocina tales como tazas o cucharas de medida para preparar alimentos después de usarlos con pesticidas.**

PASO 3: **Rocíe** como se indica. Es importante que la cobertura sea completa.

PASO 4: Enjuague bien el rociador con agua limpia después de cada uso.

**INSECTOS SUBTERRÁNEOS/INSECTOS QUE INFECTAN EL QUINCHADO** entre los que se incluyen gorgojos de pasto azul anual (adultos), escarabajo negro del césped del género *Ataenius* (adultos), piques, chinches, larvas blancas (escarabajo japonés, gusano blanco europeo, escarabajo marrón (Southern chafé)), escarabajo del estiércol y gorgojos (*Hyperdes spp.*) (adultos), típulas europeas y grillos cebolleros (ninfas y adultos jóvenes\*\*). Mezcle 0.75 onzas líquidas (1½ cda. sopera) en 1 galón de agua para tratar 125 pies cuadrados o 6 onzas líquidas en 8 galones de agua para tratar 1,000 pies cuadrados. Para el control de insectos subterráneos (grillos cebolleros, larvas), riegue el área tratada con ¼ a ½ pulgada más de agua, para obtener óptimos resultados.

**INSECTOS DE SUPERFICIE** entre los que se incluyen hormigas\*\*, gusanos soldados, grillos, gusanos cortadores, tijeretas, pulgas, gusanos tejedores (gusanos peludos), milpiés, cochinillas de la humedad, ácaros, chicharritos, garrapatas de los venados (que pueden transmitir la enfermedad de Lyme). Humedezca el pasto completamente rociando con agua algunas horas antes de la aplicación. Mezcle 0.75 onzas líquidas (1½ cda. sopera) en 1 galón de agua para cubrir 250 pies cuadrados o 3 onzas líquidas (6 cdas. soperas) en cuatro galones de agua para cubrir 1,000 pies cuadrados de césped. Para lograr el mejor control de los insectos de superficie no riegue más ni corte hasta después de transcurridas 24 horas de la aplicación. Para infestaciones severas la dosis de uso se puede aumentar a 4.5 onzas líquidas/ 1,000 pies cuadrados.

**CUÁNDO APlicAR EL TRATAMIENTO:** Trate los siguientes insectos nocivos durante los meses indicados, o cuando note su aparición por primera vez.

ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
			Gorgojos					Larvas			
				Larvas de escarabajo del estiércol							
			Gorgojos ( <i>Hyperdes spp.</i> )								

Trate las hormigas\*\* y otros insectos cuando éstos aparezcan o cuando observe daños en el césped.

\*Sólo para el control localizado. Se aplica este producto para termitas con la finalidad de matar las obreras o las formas reproductoras aladas que puedan encontrarse en ese momento en los canales tratados. Dichas aplicaciones no sustituyen los métodos mecánicos, el tratamiento del suelo ni el tratamiento de los cimientos, sino que constituyen sólo un complemento. No se recomienda utilizar este producto como única protección contra las termitas. En el caso de infestaciones activas de termitas, recurra a una inspección profesional.

\*\*Argentina, australes, de campo, "Allegheny Mound", carpinteras de la Florida, de los campos de maíz, de la miel, del pavimento, molestas.

## ALMACENAMIENTO Y ELIMINACIÓN

**Almacenamiento:** Guarde en un lugar fresco y seco, lejos del calor del fuego.

**Eliminación:** Si está vacío: No vuelva a usar este envase. Tírela a la basura u

# PRECAUTIONARY STATEMENTS

## Hazards to Humans and Domestic Animals

**CAUTION.** Harmful if swallowed. Causes moderate eye irritation. Avoid contact with skin, eyes or clothing. Wash thoroughly with soap and water after handling and before eating, drinking, chewing gum or using tobacco. Food utensils such as measuring cups and tablespoons must not be used for food purposes after use in measuring pesticides.

**First Aid • If swallowed:** Call a Poison Control Center or doctor immediately for treatment advice. Have person sip a glass of water if able to swallow. Do not induce vomiting unless told to do so by a Poison Control Center or doctor. Do not give anything by mouth to an unconscious person. **If in eyes:** Hold eye open and rinse slowly and gently with water for 15-20 minutes. Remove contact lenses, if present, after the first 5 minutes, then continue rinsing eye. Call a Poison Control Center or doctor for treatment advice. • Have the product container or label with you when calling a Poison Control Center or doctor, or going for treatment.

**Environmental Hazards •** This pesticide is extremely toxic to fish. Do not contaminate water when disposing of equipment washwaters. Do not apply directly to water. Drift and runoff from treated areas may be hazardous to aquatic organisms in neighboring areas.

This product is highly toxic to bees exposed to direct treatment or residues on blooming crops or weeds. Do not apply this product or allow it to drift to blooming crops or weeds if bees are visiting the treatment area.

**NOTICE: Buyer assumes all responsibility for safety and use not in accordance with directions.**

**Questions & Comments?** Call 1-800-917-5438 or visit our website at [www.spectracide.com](http://www.spectracide.com)

# PRECAUCIONES

## Riesgos para los seres humanos y los animales domésticos

**PRECAUCIÓN.** Nocivo si se ingiere. Causa irritación moderada a los ojos. Evite el contacto con la piel, los ojos o la ropa. Lávese bien con agua y jabón después de manipularlo y antes de comer, beber, masticar chicle o usar tabaco. No deben utilizarse utensilios para alimentos como tazas de medida y cucharas de mesa para preparar alimentos después de usarlos con pesticidas.

**Primeros Auxilios • Si se ingiere:** Llame inmediatamente a un centro de control de envenenamientos o a un médico para recibir instrucciones de tratamiento. Si la persona puede tragar, haga que beba poco a poco un vaso de agua. No induzca el vómito, a menos que así se lo indique un centro de control de envenenamientos o un médico. No administre nada por la boca a una persona que haya perdido el conocimiento.

**Si entra en contacto con los ojos:** Mantenga los ojos abiertos y enjuague con agua lentamente, con cuidado, durante 15-20 minutos. Si hay lentes de contacto, retirelos después de los primeros 5 minutos, después continúe enjuagando los ojos. Llame a un centro de control de envenenamientos o a un médico para recibir instrucciones de tratamiento. • Cuando llame a un centro de control de envenenamientos o a un médico, o intente obtener tratamiento, tenga a la mano el envase o la etiqueta del producto.

**Riesgos para el medio ambiente •** Este pesticida es extremadamente tóxico para los peces. No contamine el agua cuando elimine las aguas de lavado del equipo. No aplique directamente al agua. El arrastre y el escurreimiento del producto desde las áreas tratadas pueden resultar peligrosos para los organismos acuáticos de las zonas vecinas.

Este producto es extremadamente tóxico para las abejas que estén expuestas al tratamiento directo o a los residuos que queden en cultivos o malezas en flor. No aplique este producto ni permita que pase a los cultivos o malezas en flor en caso que haya abejas volando por la zona.

**NOTA:** El comprador asume toda la responsabilidad en caso de no seguir las instrucciones sobre seguridad y modo de empleo.

**¿Preguntas y comentarios?** Llame al 1-800-917-5438.

MADE IN THE USA Distributed by Spectrum Group

Distribution Division of United Industries Corporation

PO Box 142642, St. Louis, MO 63114-0642

EPA Reg. No. 9688-260-8845

EPA Est. Nos. 9688-MO-1 (1) 39754-WI-1 (R) 39609-MO-1 (BM) 79533-WI-1 (BT)

Circle letter is first letter of lot number.

17-12459

© 2007 UIC