

MILPRO

Antiparasitario interno en comprimidos



Composición

Milbemicina oxima y prazicuantel 12.5 mg/125 mg; 2.5 mg/25 mg; 16 mg/40 mg; 4 mg/10 mg.

Indicaciones

Tratamiento de infecciones mixtas por cestodos y nematodos adultos. Prevención de dirofilariosis si está indicado el tratamiento concomitante contra cestodos.

Posología y modo de empleo

Por kg: 0,5 mg de milbemicina oxima+5 mg de prazicuantel en perros y 2 mg de milbemicina oxima+5 mg de prazicuantel en gatos vía oral en una sola toma. Pesar para correcta dosificación. Administrar con o después de la comida. Para infecciones de *Angiostrongylus vasorum* se recomienda Milbemicina oxima 4 veces a intervalos semanales: si está indicado tratamiento concomitante frente a cestodos, administrar la primera semana y producto monovalente las 3 siguientes. Para prevenir la angiostrongilosis administrar cada 4 semanas.

Presentaciones

Perros pequeños y cachorros (24 comprimidos). Perros adultos (4 y 48 comprimidos). Gatos pequeños y gatitos (24 comprimidos). Gatos adultos (4 y 48 comprimidos).

Contraindicaciones: Hipersensibilidad al producto. No usar Milpro para perros en menores de 5 kg ni Milpro para cachorros en menores de 2 semanas y/o de 0.5 kg. No usar Milpro para gatos en menores de 2 kg ni Milpro para gatitos en menores de 6 semanas de edad y/o 0,5 kg. **Observaciones:** En muy raras ocasiones se pueden producir signos sistémicos como letargo, neurológicos (temblores, ataxia) y/o gastrointestinales. Considerar epidemiología y condiciones del animal mediante asesoramiento profesional. El uso frecuente y repetido puede causar resistencias. En perros Collie o razas relacionadas no sobrepasar la dosis y no usar en cachorros. En animales de riesgo se recomienda excluir la presencia de *Dirofilaria immitis*, en cuyo caso habría que tratar previamente con un adulticida para evitar reacciones de hipersensibilidad. En caso de equinocosis, seguir directrices específicas de tratamiento y seguimiento y de seguridad de las personas. En ausencia de estudios específicos, en animales debilitados o con funciones hepática o renal comprometidas y en gestantes, lactantes o reproductores, valorar beneficio/riesgo. En perros de menos de 4 semanas, es infrecuente una infección por cestodos y podría no ser necesario un producto combinado. Lavar las manos después del uso. En caso de ingestión accidental consulte con un médico. Aunque no ha mostrado interacción con selamectina, tener precaución al combinar con otras lactonas macrocíclicas. Eliminar conforme normativas. No verter en cursos de agua. **Nº de registro:** Milpro 12.5 mg/125 mg comprimidos recubiertos para perros 3095 ESP. Milpro 2.5 mg/25 mg comprimidos recubiertos para perros pequeños y cachorros 3094 ESP. Milpro 16 mg/40 mg comprimidos recubiertos con película para gatos 3097. Milpro 4 mg/10 mg comprimidos recubiertos con película para gatos pequeños y gatitos 3096.

Con prescripción veterinaria.

