

Galant™ R

Eiqueta Web - Ecuador

HERBICIDA AGRÍCOLA CONCENTRADO EMULSIONABLE - CE

**“LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO”
“CONSERVESE EN LUGAR CERRADO FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”**

INGREDIENTE ACTIVO:

Haloxifop Metil R	40 g/l a 20° C
Solvente aromático.....	160 g/l a 20° C

HERBICIDA SISTÉMICO CONTRA MALEZAS GRAMÍNEAS EN CULTIVOS DE HOJA ANCHA

Reg. M.A.G.: 053-H3

Reg M.S.P.

Titular de Registro: Consultimz Cia. Ltda. Representante para Ecuador de Dow AgroSciences de Colombia S.A.

**“ESTE HERBICIDA ESTÁ SUJETO A LOS REQUISITOS SEÑALADOS
EN LA LEY 073 REGISTRO OFICIAL 442 DE DE 1990 - 05 - 22”**

FABRICADO POR :

Dow AgroSciences de Colombia S.A.

Transversal 18 No. 96 - 41 Piso 7°. Tel: 219 6000

Bogotá, Colombia

IMPORTADO POR:

INTEROC S.A.

Vía a Daule Km 16,5. Tel: 2881662

Guayaquil, Ecuador



Dow AgroSciences

INTEROC @ CUSTER

® TM Marca de The Dow Chemical Company
("Dow") o una compañía afiliada de Dow

P.V.P.

CUIDADO

Galant™ R

Eiqueta Web - Ecuador

HERBICIDA AGRÍCOLA CONCENTRADO EMULSIONABLE - CE

MODO DE EMPLEO:

Para preparar la mezcla, verter agua en el tanque de pulverización hasta la mitad de su capacidad, agregar luego la dosis de Galant™ R. Añadir el resto de agua hasta completar el volumen y aplicar.

La aplicación se debe realizar en post-emergencia. Para que el producto actúe mejor, las gramíneas deben estar en activo crecimiento y bajo condiciones de humedad adecuada. Con gramíneas florecidas es preferible cortarlas y aplicar al rebrote con abundante follaje.

INSTRUCCIONES DE USO

CULTIVO	MALEZAS	DOSIS L/H	FRECUENCIA DE APLICACIÓN
Alfalfa (<i>Medicago sativa</i>)	Kikuyo (<i>Pennisetum clandestinum</i>) Saboya (<i>Panicum maximum</i>)	1,5-2,0	Aplicar a los 5 días después del corte
Algodón (<i>Gossypium</i> sp.)	Arroz (<i>Oryza sativa</i>) Bermuda (<i>Cynodon dactylon</i>)	0,75-1,0	Aplicar a los 15 ó 20 días después de la siembra
Girasol (<i>Helianthus annuus</i>)	Paja de patillo (<i>Echinochloa colonum</i>) Paja de burro (<i>Eleusine indica</i>)	1,2-1,5	Aplicar a los 15 ó 25 días después de la siembra
Palma Africana (<i>Eleais guineensis</i>)	Guarda rocío (<i>Digitaria sanguinalis</i>) Caminadora (<i>Rottboellia cochinchinensis</i>)	0,75-1,0	Aplicaciones periódicas
Piña (<i>Ananas comosus</i>)	Falsa caminadora (<i>Ischaemum rugosum</i>)	0,75-1,0	Aplicar a los 15 ó 25 días después de la siembra
Soya (<i>Glycine max</i>)	Paja colorada (<i>Panicum fasciculatum</i>)	1,2	Aplicar a los 15 ó 25 días después de la siembra

ÚLTIMA APLICACIÓN:

Corresponde a la aplicación en post-emergencia.

INTERVALO DE SEGURIDAD:

Sin restricción



Galant™ R

Eiqueta Web - Ecuador

HERBICIDA AGRÍCOLA CONCENTRADO EMULSIONABLE - CE

AVISO AL COMPRADOR:

El fabricante garantiza la composición y calidad del producto. No se responsabiliza por el uso imprudente, excesivo o indebido por parte del consumidor.

PRODUCTO LIGERAMENTE PELIGROSO
Categoría Toxicológica III



Galant™ R

Eiqueta Web - Ecuador

HERBICIDA AGRÍCOLA CONCENTRADO EMULSIONABLE - CE

Precaución: El producto puede ser mortal si se ingiere, venenoso si se inhala e irritante en caso de contacto con la piel y los ojos.

**Durante la preparación y utilización del producto:
NO FUMAR - COMER O BEBER**

Evitar la ingestión, inhalación de vapores o sustancias nebulizadas y el contacto del producto con la boca, la piel y los ojos.

**Usar guantes o botas de goma, gafas,
mascarilla y ropa de protección.**

Después de la aplicación y antes de comer-beber o fumar, lávese con abundante agua y jabón las manos y las partes expuestas de la piel y lavar perfectamente todo el equipo utilizado.

FRASES DE ADVERTENCIA

- El producto debe manejarse siguiendo las buenas prácticas agrícolas y las normas de manejo seguro de plaguicidas.
- Conservar el producto lejos de bebidas, alimentos y medicamentos de consumo humano o animal.
- Eliminar los envases vacíos de manera segura, en una fosa diseñada para tal efecto, de tal forma que no pongan en peligro a personas, animales, cultivos, alimentos almacenados o suministros de agua.
- En caso de derrame recoja el producto con un material absorbente y entiérrelo en un lugar seguro.
- Antes de destruir el envase, enjuagarlo con agua (cuarta parte del contenido) por lo menos tres veces y los residuos viértalos en el equipo de aplicación.
- No reenvasar o depositar el contenido en otros envases y repase al cultivo las aguas del lavado.
- Mantener limpio y en buenas condiciones el equipo utilizado para la aplicación, teniendo cuidado de que no se produzcan escapes, ni contaminación externa.
- No aplicar el producto directamente sobre el ganado, el pienso o los depósitos de agua.

- **Galant™ R** es tóxico para los peces; por lo tanto, no contaminar ríos, lagos o fuentes de agua, tanto al lavar los equipos de aspersión como al eliminar los residuos.

INSTRUCCIONES PARA PRIMEROS AUXILIOS Y CONSEJOS PARA LOS MÉDICOS

- * En caso de **INGESTIÓN**, la decisión de inducir o no al vómito debe ser tomada por el médico.
- * En caso de **INHALACIÓN** apartar al accidentado de la zona de peligro y suministrarle aire puro.
- * En caso de **CONTAMINACIÓN** de los ojos, lavarlos con abundante agua durante 15 minutos y acudir al médico. Si entra en contacto con la piel, bañarse con abundante agua y jabón. Despojarse de la ropa contaminada.
- * En caso de **INTOXICACIÓN LLEVAR EL PACIENTE AL MÉDICO Y ENTREGARLE UNA COPIA DE ESTA ETIQUETA.**

Síntomas: Queratoconjuntivitis, náuseas, vómito, dermatitis, diarrea.

Diagnóstico: Cuadro hemático completo, función renal, función hepática, examen toxicológico en sangre y orina.

Tratamiento: Lavado gástrico con carbón activado, evacuante salino, corticoterapia, broncodilatadores, equilibrio electrolítico y ácido básico.

No hay antídoto conocido.

Para mayor información diríjase a **INTEROC S.A.**
Vía a Daule Km 16,5. Tel: 2881662.
Guayaquil, Ecuador.

