

UNILAXYL

Composición: MANCOZEB 64% (640 gr/l) + METALAXIL 8% (80 gr/l)

Tipo de preparado: POLVO MOJABLE [WP]

Uso: Fungicida

Xn



Nocivo

N



Peligroso para
el Medio ambiente

Clasificación medioambiental

SPE 3: Para proteger los organismos acuáticos, respétese sin tratar una banda de seguridad de 5 m. en cultivos herbáceos y 20 m. en cultivos leñosos hasta las masas de agua superficial.

Tóxico para la reproducción cat. 3

Usos autorizados:

Tratamientos fungicidas en los cultivos de:

- **Brécol, cebolla, coliflor, melón, pepino, repollo y sandía**, contra mildiu.
- **Patata**, contra alternaria, antracnosis y mildiu.
- **Tabaco**, contra moho azul.

Dosis de empleo

Aplicar en pulverización normal al 0,20-0,30% (200-300 g/100 l), según estado de desarrollo del cultivo.

Plazo de seguridad

21 días entre el último tratamiento y la recolección.

Modo de empleo

Añadir agitando, evitando la formación de grumos, la cantidad necesaria de producto sobre un pequeño volumen de agua y mezclar esta papilla con el resto del líquido. Se recomienda preparar la cantidad de caldo a utilizar, evitando guardar restos para aplicaciones posteriores.

Utilización

Los tratamientos con Unilaxyl deberán realizarse de forma preventiva para un mejor control de las enfermedades.

En patata, cebolla y cucurbitáceas se realizarán un máximo de 3 tratamientos por campaña, preferentemente en las primeras fases del cultivo y prosiguiendo con fungicidas de contacto si fuera necesario. El intervalo entre tratamientos será de 14 días, reduciéndose a 10 si la presión de la enfermedad lo aconseja. El intervalo entre el último tratamiento con Unilaxyl y un posterior producto de contacto será inferior a 7 días.

En tabaco en semillero se darán 2-3 tratamientos por campaña, con un intervalo entre tratamientos de 7 días, aconsejándose el primer tratamiento en el estado de plántulas con 4 hojas.

En tabaco en campo definitivo se darán 2-3 tratamientos, con un intervalo entre tratamientos de 10 días, realizándose el primero, como máximo, a los 7 días posteriores al trasplante.