

ferroín

Antianémico inyectable



Composición

Cada ml de solución contiene:

Hierro-dextrano equivalente
a hierro elemental

100 mg

Vehículo acuoso c.s.

Propiedades

La deficiencia de hierro produce anemia que se manifiesta por palidez de las mucosas, debilidad, retraso en el crecimiento y otros síntomas.

Indicaciones

ferroín está indicado especialmente para la prevención y tratamiento de la anemia de los lechones, la cual se presenta en lechones lactantes alimentados con leche de madres deficientes en éste mineral. **ferroín** también se recomienda en bovinos como coadyuvante en entidades que producen anemia como hemorragias y hemoparásitos.

Dosis y modo de empleo

Lechones (2do - 6to día de vida):	1 - 2 ml.
Terneros:	4 - 5 ml
Bovinos adultos:	5 - 10 ml

En el tratamiento de la anemia de los lechones, usualmente una dosis es suficiente, aunque el tratamiento puede repetirse a las dos o tres semanas según el criterio del Médico Veterinario.

Como coadyuvante en anemias en bovinos, se recomienda aplicar dosis semanales por un mes.

Registro Sanitario

Ecuador 1B-4229-AGROCALIDAD

Colombia ICA- 8670-MV

Guatemala 27-01-48-10,801



Vía de administración

Intramuscular profunda.

Precauciones

Mantener fuera del alcance de los niños
Conservar a una temperatura inferior a 30°C y protegido de la luz.

Presentación

Frascos x 20 y 100 ml



NUESTRA EXPERIENCIA ES VIDA