

# ●●● ENDERAM 50

## f u n g i c i d a

|                      |                      |
|----------------------|----------------------|
| <b>COMPOSICIÓN:</b>  | <b>Tiram 50% p/v</b> |
| <b>FORMULACION:</b>  | <b>SC</b>            |
| <b>PRESENTACIÓN:</b> | <b>1 y 5 Litros</b>  |

### CARACTERISTICAS

**ENDERAM 50** es un fungicida de amplio espectro presentado en forma de Suspensión Concentrada (SC), con actividad fundamentalmente por contacto contra una amplia gama de enfermedades producidas por endoparásito y hongos del suelo. Actúa como repelente de roedores (liebres, conejos, etc.)

### APLICACIONES AUTORIZADAS

- Almendro: Mancha ocre.
- Apio: Septoria.
- Arbustos ornamentales, Frutales de hoja caduca, Frutales subtropicales, leñosas: Roedores.
- Caqui, Cucurbitáceas, Judías verdes,: Antracnosis.
- Fresales: Botritis.
- Frutales de hueso: Abolladura, Antracnosis, Chancro, Cribado, Monilia y Moteado.
- Frutales de pepita, Higuera: Monilia y Moteado.
- Granado: Cribado, Monilia y Moteado.
- Suelos de Semilleros: Hongos del suelo.
- Vid: Antracnosis y Botritis.

### DOSIS Y MODO DE EMPLEO

**ENDERAM 50** debe aplicarse en pulverización normal a la dosis general de 0,35-0,5l/ha (350-500 cc/ha), en arbustos ornamentales, frutales de hoja caduca, frutales subtropicales y leñosas a 15-25% (1,5-2,5l/10l) aplicándolo en la base de los troncos.



# ●●● ENDERAM 50

## f u n g i c i d a

### PLAZO DE SEGURIDAD

Entre el último tratamiento y la recolección de plantas o frutos destinados al consumo humano o ganadero, y en su caso entrada de ganados han de transcurrir:

- 15 días para todos los cultivos autorizados.

### CLASIFICACIÓN TOXICOLÓGICA

Xn (Nocivo) N (Peligroso para el medio ambiente)

### OBSERVACIONES

La variedad de Peral “blanquilla” puede ser sensible al producto, por lo que se recomienda realizar una prueba previa de fitotoxicidad antes de tratar todo el cultivo. No mezclar con aceites minerales ni productos de reacción alcalina.

Nº de Registro: 22.181

