

CRACK BLOQUE

Raticida

Bloques de parafina

Composición:	-Difenacoum 0,005%, Sustancia de sabor amargo 0,002%.
Formulación:	Bloques de parafina
Envases:	1 y 20 kg
Nº Registro:	09-10-03611 HA
Clasificación Toxicológica:	Xn



CRACK BLOQUE es un cebo para la eliminación de ratas y ratones, con una formulación muy atractiva y eficaz contra roedores por alto contenido en materias grasas. Contiene una sustancia amarga para mayor seguridad.

Aplicaciones Autorizadas:

Rodenticida de uso en la industria alimentaria. Exclusivamente por personal autorizado, contra ratas y ratones.

Dosis y modo de empleo :

En portacebos correctamente etiquetados. Distribuir de 2 a 5 bloques cada 5-10 metros para ratas. Para ratones, distribuir un bloque cada 2 metros.

Se tomarán todas las medidas necesarias para evitar que el producto contamine los utensilios, los alimentos y sus envases, así como las superficies donde se manipulen, preparen o hayan de servirse o consumirse alimentos.

Recomendaciones:

Cubrir el producto a fin de evitar su toma accidental por otros animales a los que no va dirigido.

Usar guantes.

Los cebos se deben reponer cada semana.

Gestión de envases:

Este envase, una vez vacío después de utilizar su contenido, es un residuo peligroso por lo que el usuario está obligado a entregarlo en los puntos de recepción del sistema integrado de gestión de SIGFITO.

La intoxicación puede producir:

Diátesis hemorrágica, derivado del efecto antiprotrombina –tiempo prolongado de la protrombina- que puede hacerse evidente en un plazo mínimo de 24 horas y máximo de 72 horas (Un tiempo de protrombina normal al ingreso, no excluye el diagnóstico).

Primeros auxilios:

- Retire a la persona de la zona contaminada
 - Quite la ropa manchada o salpicada.
 - Lave los ojos con abundante agua al menos durante 15 minutos. No olvide retirar las lentillas.
 - Lave la piel con abundante agua y jabón, sin frotar.
 - En caso de ingestión, NO provoque el vómito.
 - Mantenga al paciente en reposo.
 - Conserve la temperatura corporal.
 - Controle la respiración. Si fuera necesario, respiración artificial.
 - Si la persona está inconsciente, acuéstela de lado con la cabeza más baja que el resto del cuerpo y las rodillas semiflexionadas.
 - Traslade al intoxicado a un centro hospitalario, y siempre que sea posible, lleve la etiqueta o el envase.
- NO DEJE SOLO AL INTOXICADO EN NINGÚN CASO.**