HOJA INFORMATIVA

FLASH

ACARICIDA ESPECÍFICO

acaricidas

en forma de
"SUSPENSIÓN CONCENTRADA" (SC)

Fenpiroximato.....5% p/v (50 g/l)

-Contiene 1,2-benzisotiazol-3-(2H)-ona (nº CAS: 2634-33-5)-

CARACTERÍSTICAS

Flash es un acaricida específico que actúa sobre Larvas, Ninfas y Adultos de los principales Ácaros que atacan a los cultivos. Posee excelente eficacia sobre las especies *Panonychus* y *Tetranychus* y en especial sobre la Araña Roja de los Frutales (*Panonychus Ulmi*) y el Acaro rojo de los Cítricos (*Panonychus citri*).

APLICACIONES AUTORIZADAS

FRUTALES DE PEPITA, MELOCOTONERO, NECTARINO, ALBARICOQUERO, CIRUELO, CÍTRICOS, VID, TOMATE, BERENJENA, JUDÍAS VERDES, FRESALES, ORNAMENTALES LEÑOSAS Y ORNAMENTALES HERBÁCEAS: Contra formas móviles de Araña roja.

CÍTRICOS: Contra formas móviles de araña roja y ácaros tetraníquidos

VID: Contra formas móviles de araña roja, ácaros tetraníquidos y mosquito verde.

PERAL: Contra Erinosis.

DOSIS Y MODO DE EMPLEO

El contenido de nuestro envase 30 ml es la dosis adecuada para 1 mochilas.
En aplicaciones con pulverizadores normales utilícese 2 ml por litro de agua.

Aplicar cuando se observen los primeros síntomas de infestación (2-3 formas móviles/hoja), mojando completamente la vegetación a proteger hasta goteo.
En peral, contra psila, realizar una única aplicación por campaña.

Beltrán Báguena, 5• E-46009 Valencia• telf. 96 348 35 88• fax. 96 349 77 27 • e-mail: sipcamjardin@sipcam.es

SIPCAM JARDÍN

HOJA INFORMATIVA

CALENDARIO DE APLICACIÓN

E F M A M **J J A S O** N D

PLAZOS DE SEGURIDAD

Deberán transcurrir entre el último tratamiento y la recolección, al menos, 14 días en Frutales de hueso, Cítricos y Vid; 7 días en Frutales de pepita y Judías verdes y 3 días en el resto de cultivos.

PRESENTACIÓN

Envase de 30 ml (dosis mochila).

DATOS DEL REGISTRO

- **Nº de Registro:** 19.241
- **Mitigación de Riesgos Medioambientales:**
  - Mamíferos: A
  - Aves: A
  - Peces: C. Muy peligroso
  - Abejas: Relativamente poco peligroso

  Para protección de las abejas, tratar en las horas en que no estén presentes (atardecer y amanecer)

  Muy tóxico para los organismos acuáticos, puede provocar a largo plazo efectos negativos en el Medio Ambiente acuático

Beltrán Báguena, 5• E-46009 Valencia• telf. 96 348 35 88• fax. 96 349 77 27 • e-mail: sipcamjardin@sipcam.es