

antibang

Cepa 19

Vacuna contra la brucelosis



Composición

Cada dosis (2 ml) contiene de 15.000 a 30.000 millones de gérmenes vivos de *Brucella abortus* (Cepa 19).

Indicaciones

Inmunización de las hembras bovinas contra la brucelosis.

Dosis y modo de empleo

Vacunar todas las terneras de 3 a 8 meses de edad, por una sola vez. La dosis general es de 2 ml.

Vía de administración

Subcutánea

Precauciones

Mantener fuera del alcance de los niños
Conservar en refrigeración entre 3 y 7°C.

La vacuna debe ser reconstituida y usada inmediatamente.

La exposición de la vacuna a la luz solar y la demora en su aplicación deterioran el producto.

No vacunar machos.

No vacunar animales enfermos o fatigados, desnutridos o en estado febril. La cepa 19 es patógena para el ser humano: se debe tener cuidado al manipularla. Los frascos con restos de vacuna no empleada deben ser incinerados.

En caso de reacción anafiláctica, administrar adrenalina (epinefrina) y un corticoide tipo dexametasona y consultar al Médico Veterinario.

Registro Sanitario

Ecuador 4A-1957-AGROCALIDAD



Presentación

Frasco x 5 dosis + diluyente.



NUUESTRA EXPERIENCIA ES VIDA