

**EXCEDRIN®**  
Ácido acetilsalicílico, paracetamol, cafeína  
Tableta  
250 mg/ 250 mg /65 mg

Caja con frasco con 10, 24 ó 48 tabletas

**Alivia los síntomas de la Migraña**

**Fórmula:**

Cada tableta contiene:

Ácido acetilsalicílico	250 mg
Paracetamol	250 mg
Cafeína	65 mg
Excipientes cbp	1 tableta

**Indicaciones terapéuticas:** Indicado para el alivio de los síntomas de la migraña.

**Vía de administración:** Oral. Léase instructivo anexo.

**Dosis y modo de empleo:** **Dosis recomendada para pacientes con diagnóstico de Migraña: Adultos y mayores de 18 años:** tomar 2 tabletas con un vaso de agua; no tomar más de dos tabletas en 24 horas, o lo que indique su médico.

**Uso en el embarazo y lactancia:** No se use durante el embarazo, ni lactancia. (Logosímbolo Mujer Embarazada)

**Contraindicaciones:** Hipersensibilidad a cualquiera de los componentes de la fórmula. Enfermedades hepáticas, ingestión de anticoagulantes, trastornos de coagulación, úlcera péptica activa. No debe utilizarse en presencia de varicela o influenza, ya que el uso de ácido acetilsalicílico se ha asociado al síndrome de Reye en niños menores de 14 años. Especial precaución en caso de: asma, úlceras, acidez.

**Precauciones y Advertencias:** Este medicamento contiene colorante azul No. 1, el cual puede producir reacciones alérgicas.

- **Uso pediátrico:** No se use en menores de 18 años.
- **Reacciones adversas:** En caso de zumbido en los oídos, pérdida de audición o molestia estomacal suspenda el tratamiento y consulte a su médico.
- **Interacciones medicamentosas:** No use este medicamento si usted usa cualquier otro producto que contenga paracetamol. Se debe limitar el uso de otros productos que contengan cafeína debido a que demasiada cafeína puede causar nerviosismo, irritabilidad, insomnio y ocasionalmente incremento en el latido. No tomar conjuntamente con alcohol.

**Ingesta accidental y sobredosis:** En caso de ingestá accidental o sobredosis consulte a su médico.

No exceder la dosis recomendada.

Si persisten las molestias, consulte a su médico.

No se deje al alcance de los niños

Consérvese a no más de 30°C y en lugar seco.

Conserve el frasco bien cerrado.

Contiene un desecante NO INGERIBLE, consérvese dentro del envase.

Reporte las sospechas de reacción adversa al correo: farmacovigilancia@cofepris.gob.mx

**Hecho en E.U.A. por:**

Novartis Consumer Health Inc.

Lincoln, NE 68517 EUA.

**Acondicionamiento secundario por:**

Novartis Farmacéutica, S.A. de C.V.

La Candelaria No. 186, Local A,

Col. Atlántida, C.P. 04370,

Deleg. Coyoacán, D.F., México.

**Almacenado y Distribuido por:**

Novartis Farmacéutica, S.A. de C.V.

Autopista México-Querétaro Km. 34.5

Nave 6 Interior 3 Col. San Isidro, C.P. 54740

Cuautitlán Izcalli, México.

Reg. No. 273M98 SSA VI

® Marca Registrada