



Cebión® 1000

Ácido ascórbico

Composición cuantitativa

Cada sobre de granulado para solución oral de **Cebión 1000** contiene:
Ácido ascórbico (DOE) (Vitamina C) 1000 mg
Excipientes: Sacarina de sodio, sacarosa, ácido cítrico monohidrato, amarillo anaranjado S (E-110), aromas de naranja.

Propiedades

El organismo humano necesita diariamente la Vitamina C (Ácido ascórbico) a todas las edades. Esta vitamina es de gran importancia puesto que interviene en numerosos procesos del organismo, particularmente en relación con la formación de colágeno, la proteína que constituye la membrana basal de los capilares, las fibras del tejido conjuntivo y la matriz orgánica de los tejidos duros, como el hueso y el diente.

Indicaciones

Prevención de estados carenciales de Vitamina C.
Aunque la dieta habitual es rica en ácido ascórbico y cubre las necesidades de esta vitamina, sin embargo en algunos casos como úlcera péptica, hipertiroidismo, diarrea crónica, embarazo, tabaquismo, uso de anticonceptivos hormonales, estados de malnutrición que no pueden corregirse con la dieta (ej. pacientes bajo regímenes dietéticos), puede ser necesario un mayor aporte de Vitamina C.

Posología y modo de empleo

Adultos: como norma general, un sobre de **Cebión 1000** al día.

Contraindicaciones

En condiciones normales no necesitan administrarse en el embarazo dosis superiores a los 100 mg al día y, en cualquier caso, siempre por indicación del médico. Aunque no hay evidencia de efectos perjudiciales, la seguridad fetal de las dosis altas de Vitamina C no ha sido establecida.

Advertencia

Si está tomando este medicamento, las pruebas de glucosa en orina, incluyendo las pruebas por tiras reactivas, pueden dar resultados erróneos, lo que deberá ser tenido en cuenta por los pacientes diabéticos.

Advertencia sobre excipientes

Este medicamento contiene amarillo anaranjado S como excipiente. Puede causar reacciones de tipo alérgico, incluido asma especialmente en pacientes alérgicos al ácido acetilsalicílico.

1235213-G

Importante para la mujer:

Si está usted embarazada o cree que pudiera estarlo, consulte a su médico antes de tomar este medicamento. El consumo de medicamentos durante el embarazo puede ser peligroso para el embrión o el feto y debe ser vigilado por su médico.

Precauciones

No deben tomarse dosis altas en el embarazo (ver apartado de Contraindicaciones). Los pacientes con historia de formación de cálculos o gota deberán consultar a su médico antes de tomar este medicamento.

Efectos secundarios

Las dosis superiores a 1 g por día pueden producir diarrea, cálculos renales y calambres abdominales.

Asimismo, existe el riesgo de formación de cálculos y de precipitar ataques agudos de gota en individuos predispuestos.

Interacciones

La Vitamina C en dosis altas, puede modificar la acción de ciertos medicamentos.

Consulte a su médico o farmacéutico si está tomando antidepresivos, anticoagulantes, dosis altas de salicilatos, sulfamidas, Trimetoprim/Sulfametoxazol o anticonceptivos hormonales.

Intoxicación y su tratamiento

En caso de sobredosis o ingestión accidental, consultar al Servicio de Información Toxicológica. Teléfono 91 562 04 20.

Presentaciones

Cebión 1000 Envase con 12 sobres de granulado para solución oral.

Otras presentaciones: Cebión 500 Envase con 12 sobres de granulado para solución oral.

Sin receta médica.

Los medicamentos deben mantenerse fuera del alcance de los niños.

Merck Farma y Química, S.A.

Polígono Merck
08100 Mollet del Vallés (Barcelona)



1235213-G

Conforme:	Producto: Prospecto CEBIÓN 1000	CÓDIGOS	
	Material: Papel lito blanco 56 g.	Merck: 1235213-G	
Fecha:	Tintas: 3+1 Color: Negro. Pant. Red 032. Pant. 361 + Negro	Sanidad:	
Edición: 26/11/02	Tamaño: 110x180 Plegado: No	Página: 1	G. Maculart: 091P213-G