

XYLOCAINA POMADA 5%

COMPOSICIÓN

Cada gramo de pomada contiene:

Lidocaína (DCI).....50 mg
Excipientes: macrogol 4000,
macrogol 1500, polietilenglicol,
agua purificada c.s.p. 1 g

PROPIEDADES

XYLOCAINA POMADA 5% contiene un 5% de lidocaína base en un vehículo hidrosoluble. Su acción anestésica tópica es potente, con un período de latencia, en general de 3 a 5 minutos. No es efectiva cuando se aplica sobre la piel intacta. La pomada se elimina fácilmente con agua.

INDICACIONES

- Anestesia tópica de la mucosa de la orofaringe en odontología.
- Anestesia lubricante para la intubación endotraqueal.
- Alivio del dolor en quemaduras leves poco extensas, quemaduras solares, lesiones producidas por Rayos X, por herpes y prurito.
- Pezones dolorosos.
- Proctoscopia y Sigmoidoscopia.
- Hemorroides y fisuras anales.

CONTRAINDICACIONES

En pacientes hypersensibles a los anestésicos locales de tipo amida.

ADVERTENCIAS

Deportistas

Se informa a los deportistas que este medicamento contiene un componente que puede establecer un resultado analítico de Control del dopaje como positivo.

EFFECTOS SECUNDARIOS

Son extremadamente raras las reacciones alérgicas a la lidocaína y anestésicos locales del tipo amida.

INTOXICACIÓN Y SU TRATAMIENTO

Al igual que con otros anestésicos locales, debido a una excesiva dosificación o a una rápida absorción, en especial por la tráquea y árbol bronquial, que puede simular una inyección intravenosa lenta, pueden presentarse reacciones sistémicas que pueden afectar al SNC y al sistema cardiovascular. En estos casos el tratamiento será seguir la normativa general. En caso de sobredosificación o ingestión accidental consultar al Servicio de Información Toxicológico. Teléfono (91) 562 04 20.

DOSIFICACIÓN Y MODO DE EMPLEO

La pomada debe ser aplicada en forma de una capa fina. Sobre los tejidos lesionados puede aplicarse con un apósito estéril adecuado. Se distribuye la pomada sobre el catéter traqueal.

En Odontología se aplicará tras el secado de la mucosa oral. La eliminación del exceso de saliva con una torunda de algodón o un eyector de saliva, minimiza la dilución de la pomada y posibilita la máxima penetración.

Para la inserción de nuevas dentaduras, se aplicará la pomada en todas aquellas partes en contacto con la mucosa.

Pezones dolorosos en madres lactantes: aplicar sobre un trozo pequeño. Debe lavarse bien inmediatamente antes de la siguiente toma.

DOSIFICACIÓN MÁXIMA RECOMENDADA

La absorción de los anestésicos locales en la tráquea y en el árbol bronquial, es muy rápida, por lo que se evitará la administración de dosis excesivas, que pueden producir reacciones de intoxicación. En los niños, la dosis máxima se calculará en función del peso corporal. La dosis máxima en 24 horas para un adulto de 70 kg de peso, es equivalente a 35 gramos de XYLOCAINA POMADA 5%. Si se dosifica en función del peso del paciente, no debe superarse la dosis máxima de 25 mg/kg de peso corporal por día. En pacientes debilitados, de edad avanzada, enfermos graves y niños, la dosis debe reducirse según la edad y el estado general.

OBSERVACIONES

Para evitar eventuales contaminaciones cruzadas, se desecharán las porciones no utilizadas en una aplicación.

PRESENTACIÓN

Envase con 15 gramos.

USO CUTANEO

LOS MEDICAMENTOS DEBEN MANTENERSE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

Laboratorios INIBSA, Ctra. Sabadell a Granollers, km 14,5 08185 Lliçà de Vall BARCELONA