



Saat Cumbia® 75 WP

FUNGICIDA DE USO AGRÍCOLA

Polvo Mojable (WP)

Registro Nacional ICA No. 198

Titular del Registro: Saat Andina S.A.

COMPOSICION GARANTIZADA

Ingrediente activo: Triciclazol: 5-metil-1,2,4-triazolo[3,4-b][1,3]benzotiazol 75%

Ingredientes aditivos: 25%

IMPORTADO Y DISTRIBUIDO POR:

CONTENIDO NETO: 1 Kilogramo



SAAT ANDINA S.A.

Autopista Medellín Km. 1,5 PAO L-21,

Bogotá - Cota, COLOMBIA.

Tels. (1) 6362511 - 8643342

saat.colombia@saat-ag.com

www.saat-ag.com

® Marca Registrada Saat AG, Delémont, Suiza.



DAÑINO

LEA CUIDADOSAMENTE ESTA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO. MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

Precauciones: ESTE PRODUCTO ES CATEGORÍA TOXICOLÓGICA II: MODERADAMENTE PELIGROSO; por lo cual, se recomienda observar todas las precauciones necesarias en el manejo y la aplicación de estos plaguicidas. **Causa irritación moderada a los ojos.**
Grupo Químico: Azoles.

SEGURIDAD PARA EL USUARIO

No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación. Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado. Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón. Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.

PRIMEROS AUXILIOS

En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente, o lleve el paciente al médico y muéstrele la etiqueta. Retire al paciente de cualquier contacto adicional con plaguicidas y llévelo a un lugar bien ventilado. En caso de contacto con los ojos lavarlos con abundante agua fresca y si el contacto fuese con la piel, lavarse con abundante agua y jabón. Evite exponer el paciente a temperaturas extremas.

TELÉFONO DE EMERGENCIA 24 HORAS:

CISPROQUIM 1 2886012 (BOGOTÁ), 01 8000 916012 (RESTO DEL PAÍS)

TELÉFONOS DEL TITULAR DEL REGISTRO:

SAAT ANDINA S.A. 1.6362511 - 1.8643342

ANTÍDOTO: No hay antídoto específico conocido. Aplique tratamiento sintomático.

Contacto con la piel: Quite la ropa y calzado contaminados y lávese con abundante agua y jabón. Reciba atención médica en caso de irritación.

Contacto con los ojos: Lávese abundantemente con un chorro de agua pura durante 15 minutos, manteniendo los párpados abiertos. Reciba atención médica en caso de irritación.

Ingestión: Lávelo el médico inmediatamente, o lleve el paciente al médico y muéstrele la etiqueta. **Nota:** Nunca suministre nada por vía oral a un paciente inconsciente.

AMBIENTE: No contamine fuentes de agua (canales de riego, lagos, lagunas, quebradas, ríos, cascadas, canales de drenaje, etc.) con los sobrantes de la aspersión.

Las áreas aplicadas no deben ser pastoreadas ni cosechadas, antes de que pase el PC (Intervalo de seguridad entre la última aplicación y la cosecha). Ningún envase que haya contenido plaguicidas deberá utilizarse para conservar alimentos o agua potable.

Triple lavado: Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo triturándolo o perforándolo y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.

ALMACENAMIENTO: Mantenga el producto en sus envases originales en un lugar seguro, seco y fresco, FUERA DEL ALCANCE DE NIÑOS, PERSONAS IRRESPONSABLES Y ANIMALES DOMÉSTICOS. No transporte ni almacene con productos de uso humano o pecuario. Evite almacenar a temperaturas por encima de 20°C.

Derrames: recoja los con algún material absorbente (por ej. aserrín), colóquelos en una bolsa plástica y deposítelos en un sitio adecuado (lejos de fuentes de agua, cultivos o zonas habitadas).

Fecha de aprobación etiqueta: 02/12/2005

INDICACIONES GENERALES
Consulte con un Ingeniero Agrónomo.

CAMPOS DE APLICACIÓN (USOS) Y DOSIS

CULTIVO	ENFERMEDAD	TRATAMIENTO	DOSIS	PC (Días)
Arroz	Pyricularia oryzae	Semilla	1 - 2 g/Kg semilla*	30
		Follaje	200 - 300 g/Ha	
		Espiga	200 - 300 g/Ha	

PC: Período de Carencia. Intervalo entre la última aplicación y la cosecha.
*: Para tratamiento de semillas diluir en 30 cm³ de agua.

MODO DE ACCIÓN

Saat Cumbia® 75 WP es un fungicida sistémico, se absorbe rápidamente a través de las raíces y en menor grado a través del follaje y luego se presenta translocación acropetal a otras partes de la planta. Inhibe la síntesis de melanina de los hongos, por la inhibición de las enzimas que participan en la biosíntesis, en especial la trihidroxinaftaleno reductasa.

MODO DE EMPLEO

El tratamiento de semillas está indicado para infecciones tempranas de piricularia en hoja (0 - 45 días).

Para el follaje aplique con los primeros síntomas del ataque, repetir 20 días después si las condiciones climáticas son propicias para la piricularia. Para tratamiento en la espiga aplicar con 5 % de espigamiento y repetir 14 días después.

Para aplicaciones como tratamiento de semillas recurrir a plantas de tratamiento de semillas. Se recomienda utilizar colorantes en la mezcla para identificar la semilla tratada. Las semillas tratadas deben ser usadas sólo para siembra, no pueden ser usadas como alimento, ración o para producción de aceite.

En aplicaciones terrestres aplicar con un volumen de 200-400 l/ha, dependiendo del desarrollo del follaje, y en aplicaciones aéreas con un volumen de 35-75 l/ha. Ver otras recomendaciones de aplicación en www.saat-ag.com.

COMPATIBILIDAD Y FITOTOXICIDAD

Usado de acuerdo a lo prescrito, no presenta problemas de fitotoxicidad en el cultivo de arroz. Para usar en mezcla con otros productos, debe diluir primero este producto y luego agregar los otros productos. En cualquier caso, se recomienda al usuario hacer una prueba previa, bajo su responsabilidad, con las mezclas planeadas para observar los aspectos físicos de la mezcla y las reacciones sobre las plantas tratadas.

INFORMACIÓN SOBRE RESPONSABILIDAD

El Titular del Registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.

