

# CÂRFAL<sup>®</sup>

## WG

Fungicida sistémico, con capacidad de traslocación ascendente y descendente, para el control de Fitoftora y Mildiu en numerosos cultivos y plantas ornamentales. Su modo de acción original hace que una vez aplicado, metabolizado y distribuido en el interior de la planta, se activen los mecanismos de autodefensa de la misma para lograr el control de la enfermedad.

### APLICACIONES AUTORIZADAS

**Frutales de pepita, aguacate y fresales**, contra *Phytophthora spp.*, a la dosis de 250-300 g/hl.

**Cítricos**, contra aguado, gomosis parasitaria o podredumbre del cuello (*Phytophthora spp.*) a la dosis de 250-300 g/hl.

**Cipreses**, contra podredumbre del cuello (*Phytophthora spp.*) a la dosis de 250-300 g/hl.

**Cucurbitáceas y lúpulo**, contra mildiu a dosis de 250-300 g/hl.

**Céspedes** (deportivos o de esparcimiento) contra *Phytophthora* y *Pythium* a la dosis de 12 a 24 kg/ha.

<b>Composición</b>	Fosetil-al 80% p/p (800 g/kg)
<b>Formulación</b>	Granulado Dispersable en Agua (WG)
<b>R.O.P.M.F. n°</b>	23.788
<b>Envasado</b>	5 kg (5x1 kg)
<b>Clasificación</b>	Irritante (Xi) Mamíferos: A    Aves: A    Peces: A Compatible con abejas

### DOSIS Y MODO DE EMPLEO

Aplicar en pulverización normal por vía foliar a dosis de 250-300 g/hl, excepto para las cipreses en vivero que se aplicará al suelo, mediante regadera, dosificando a razón de 10 g/m<sup>2</sup>. En céspedes aplicar a dosis de 12 a 24 kg/ha. En aguacate, fresales y frutales de pepita, con efecto complementario contra bacteriosis, dando 2-3 tratamientos a 250-375 g/hl que cubra la época de floración.

### OBSERVACIONES

Para conseguir una actuación eficaz del producto deben efectuarse las aplicaciones durante el periodo de crecimiento activo de la planta.

No mezclar con Dicofol, aceites, abonos foliares que contengan Nitrógeno mineral, productos cúpricos ni mojantes.

En caso de tratamientos con aceite, consúltese con la Empresa Titular o Distribuidora, las condiciones de su aplicación, así como el plazo que ha de transcurrir antes o después del tratamiento con Carfal WG.

### PLAZO DE SEGURIDAD

Fresales, 7 días.

Resto de cultivos autorizados, 15 días.