



acaricida

COMPOSICIÓN:	Abamectina 1.8% p/v
FORMULACION:	EC
PRESENTACIÓN:	15 cc / 250cc / 1 y 5 litros

CARACTERÍSTICAS

CABLE es un Acaricida e Insecticida natural de acción translaminar y sistémica localizada.

APLICACIONES AUTORIZADAS

En Algodonero, Apio, Cucurbitáceas, Fresales, Ornamentales herbáceas, Peral, Pimiento y Tomate: contra Ácaros.

En Apio, Cucurbitáceas, Fresales, Ornamentales herbáceas, Pimiento y Tomate: contra Liriyomiza.

En Cítricos: contra Phyllonistis.

En Mora-Frambueso: contra Araña roja.

En Peral: contra Erinosis y Psila

DOSIS Y MODO DE EMPLEO

Aplicar a dosis de 0.05-0.1%, excepto en Cítricos contra Phyllocnistis que se aplicara a razón de 0.03-0.04%.

CABLE se aplica en pulverización normal sin sobrepasar en ningún caso la dosis de 1,5 l/ha.

PLAZO DE SEGURIDAD

Días que han de transcurrir, como mínimo, entre el último tratamiento y la recolección de plantas o frutos con destino a consumo humano o ganadero, y, en su caso, entrada de ganados.

- Para Algodonero, Cucurbitáceas, Fresales, Mora-Frambueso, Pimiento, y Tomate: 3 días.

- Para Apio, Cítricos. Peral: 10 días

-Ornamentales herbáceas: No procede fijar plazo de seguridad.



acaricida

CLASIFICACIÓN TOXICOLÓGICA

Xn (Nocivo), N (Peligroso para el Medio Ambiente).

OBSERVACIONES

Para evitar problemas de resistencias no tratar más de 3 veces al año y alternar con acaricidas de distinto modo de acción para evitar la aparición de las mismas.

ABAMECTINA NO SE DEBE MEZCLAR CON CAPTAN NI CON PRODUCTOS INCOMPATIBLES CON EL ACEITE. SI SE QUIERE MEZCLAR CON OTROS PRODUCTOS DEBE HACERSE UNA PRUEBA PREVIA O CONSULTAR CON EL SERVICIO TÉCNICO DE LA CASA SUMINISTRADORA.

En Cítricos aplicar un volumen de caldo de 2000-3500 l/ha, según la frondosidad de la plantación. Es conveniente añadir un aceite de verano a dosis de 0.2-0.5%.

En Tomate contra ácaros y liryomiza en cultivo de invernadero el plazo de seguridad sera de 7 días.

Nº de Registro: 23.809

