BANGO

insecticida

COMPOSICIÓN:	**Clorpirifos 48% p/v**
FORMULACION:	**EC**
PRESENTACIÓN:	**1 y 5 Litros**

CARACTERISTICAS

BANGO es un insecticida presentado en forma de Concentrado Emulsionable, que actúa como inhibidor de la colinesterasa por ingestión, contacto e inhalación sobre numerosas plagas de varios cultivos.

APLICACIONES AUTORIZADAS

- Alcachofa, Alfalfa, Algodonero, Cebolla, Coles de china, Rábano, Remolacha Azucarera, Repollo y Zanahoria: contra Orugas.
- Cereales: contra Zabro.
- Cítricos: contra Cochinillas, Pulgones, Mosca blanca y Prays.
- Fresales, Frambueso y Grosellero: contra Rosquilla negra y otras Orugas.
- Maíz (no utilizar en Maiz dulce): Heliotis, Rosquilla negra y Taladro sellero.
- Patata: Escarabajo y Polilla.
- Platanera: Cochinillas, Tryps, Orugas, Lapillas, Mosca blanca y Picudo de platanera.
- Solanáceas: Heliotis, Rosquilla negra y otras Orugas.
-Vid: Piral, Polillas, Castañeta, Gorgojos, Gusanos grises, Melazo y Mosquito verde.
- Eriales: contra ortopteros.

salquisa agrociencias

BANGO

insecticida

DOSIS Y MODO DE EMPLEO

La dosis de utilización es de 150 - 200 cc/hl (0,15 - 0,2%). Aplicar en pulverización normal, mojando bien toda la vegetación. No aplicar mediante nebulizadores ni atomizadores.

PLAZO DE SEGURIDAD

7 días para Alcachofa y Solanáceas, y 21 para le resto de cultivos autorizados.
En Eriales el tratamiento contra ortópteros es aplicable igualmente en todos los cultivos en que está autorizado el uso de este preparado contra otras plagas, bajo iguales condiciones de dosis y plazo de seguridad.
En Eriales el tratamiento contra ortópteros es aplicable igualmente en todos los cultivos en que está autorizado el uso de este preparado contra otras plagas, bajo iguales condiciones de dosis y plazo de seguridad.

CLASIFICACIÓN TOXICOLÓGICA

Xn (Nocivo) N (Peligroso para el medio ambiente)

OBSERVACIONES

Aplicar en pulverización normal.
No aplicar mediante nebulizadores ni atomizadores.

En Cereales contra Zabro, aplicar antes del encañado.
En Platanera contra el Picudo de la platanera aplicar mediante inyección al tocón 15 días despues de cosechada la fruta, a razón de 750cc./planta de un caldo preparado a la dosis indicada.
En Vid contra Gorgojos y Gusanos grises aplicar al momento del desborre.

Nº de Registro: 22.499

salquisa agrociencias

Fecha de Revisión: 15/01/2007