

## NITROGLICERINA 0,2%

### INFORMACIÓN AL PACIENTE

#### COMPOSICIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVA

#### FORMA FARMACÉUTICA:

DOSIS UNITARIA: Cada gramo del preparado contiene 2 miligramos de nitroglicerina.

#### NÚMERO DE DOSIS:

INDICACIONES: Tratamiento del dolor y la cicatrización de fisuras anales.

VÍA DE ADMINISTRACIÓN: Tópica anal.

POSOLOGÍA: **Según indicación médica.**

Posología USUAL: Salvo distinto criterio médico aplicar medio gramo del preparado (el equivalente a un guisante) sobre la zona afectada 1 o 2 veces al día mediante un ligero masaje, durante al menos 6 semanas.

NORMAS PARA LA CORRECTA ADMINISTRACIÓN: Siga estrictamente las dosis y pautas (modo de empleo y duración del tratamiento) indicadas por su médico. Lavar cuidadosamente la zona anal con agua y secar bien; no usar jabón mientras persista la lesión. Se aconseja aplicar el preparado sobre la zona a tratar dando un ligero masaje. Para la aplicación del preparado es importante utilizar siempre guantes de látex desechables. No administrar conjuntamente con sildenafil. No suspender bruscamente el tratamiento (disminuir progresivamente las dosis diarias y aumentar los intervalos de administración). No tomar bebidas alcohólicas. La aplicación de baños de asiento de agua tibia con sal también proporciona alivio. Es muy importante evitar el estreñimiento y mantener las heces blandas, para ello es fundamental una dieta rica en fibra, beber abundante agua (5 o 6 vasos al día) y hacer ejercicio físico.

#### CONTRAINDICACIONES:

Hipersensibilidad a alguno de sus componentes o a los nitratos en general. Infarto de miocardio reciente. Shock cardiogénico. Anemia. Traumatismo cráneo-encefálico. La seguridad y eficacia en menores de 18 años no ha sido establecida: Uso no recomendado en niños. PRECAUCIONES: Especial control clínico en ancianos, pacientes con glaucoma, hipotensión, hipovolemia, hipotiroidismo, insuficiencia renal y/o hepática.

## **NITROGLICERINA 0,2%**

### **INFORMACIÓN AL PACIENTE**

**INTERACCIONES:** El efecto hipotensor de la nitroglicerina puede ser aumentado por el alcohol, vasodilatadores y por otras sustancias hipotensoras. El ácido acetilsalicílico puede aumentar los niveles plasmáticos de nitroglicerina con posible potenciación de su toxicidad. Puede inhibir el efecto anticoagulante de la heparina y el trombolítico de la alteplasa. Puede aumentar la absorción de dihidroergotamina con posible potenciación de la acción y/o toxicidad. Dosis altas de nifedipina pueden producir una inhibición del efecto de la nitroglicerina. Administrado junto con sildenafil se potencian los efectos hipotensores (no administrar conjuntamente). Puede alterar los valores en sangre de colesterol (reducción).

**EMBARAZO Y LACTANCIA:** Contraindicado en embarazo. Se desconoce si se excreta en cantidad significativa por la leche materna, por lo tanto no se recomienda su uso.

**EFFECTOS SECUNDARIOS:** Son frecuentes, aunque leves y transitorios: cefaleas, mareos y/o sensación de ligera inestabilidad (sensación vertiginosa), sofocos, palpitaciones, rubor facial, hipertensión de rebote, náuseas, vómitos, dolor abdominal, hipotensión (potenciada por el alcohol u otros vasodilatadores), dermatitis exfoliativa, dermatitis de contacto y erupciones exantemáticas. Raramente tras la aplicación tópica se pueden producir eritema, irritación, prurito y reacciones anafilácticas caracterizadas por edema conjuntival o de la mucosa oral. El tratamiento debe ser suspendido inmediatamente en el caso que el paciente experimente algún episodio de hipotensión ortostática. Si experimente dolor de cabeza puede aliviarse con un analgésico como el paracetamol. Si se levanta bruscamente, puede sufrir mareos; téngalo en cuenta si va a conducir o manejar maquinaria peligrosa.

**POSIBLES EFECTOS SOBRE LA CAPACIDAD DE CONDUCCIÓN DE VEHÍCULOS O DE MANIPULACIÓN DE DETERMINADAS MÁQUINAS:** No se aconseja la conducción de vehículos ni el manejo de maquinaria peligrosa o de precisión durante, al menos, las primeras semanas de tratamiento.

### **CONSERVACIÓN:**

Conservar en nevera.

Proteger del calor y luz directa.

Mantener el envase bien cerrado y lejos del alcance de los niños.

**CADUCIDAD ESTIMADA:** 1 mes. Desechar el preparado sobrante una vez acabado el tratamiento.

### **SOBREDOSIS:**

La intoxicación por éste medicamento, a las dosis recomendadas, es improbable.

**NITROGLICERINA 0,2%**

**INFORMACIÓN AL PACIENTE**

En caso de sobredosis o ingestión accidental acudir a un centro médico, indicando el producto y la cantidad ingerida o consultar en INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA: 91-5620420 (24 horas).

**NOMBRE, DIRECCIÓN Y TELÉFONO DE LA FARMACIA DISPENSADORA:**

.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

**ANTES DE USAR SU MEDICACIÓN, CONSULTE A SU FARMACÉUTICO SI:**

- Tiene dudas en cuanto a la dosis o pauta de administración.
- Está tomando otros medicamentos (también anticonceptivos orales).
- Es alérgico a algún medicamento o sustancia.
- Padece alguna enfermedad crónica: diabetes; hipertensión; úlcera gastroduodenal; glaucoma; epilepsia; insuficiencia hepática, renal, cardíaca o respiratoria; etc.
- Está embarazada o podría estarlo.
- Está en periodo de lactancia.
- Desea información sobre efectos secundarios, contraindicaciones o cualquier otra cuestión relacionada con su tratamiento.