

BOROSAN[®]



Antiséptico bucofaringeo

COMPOSICIÓN: Por cada 100 g contiene:

Perborato de sodio seco y activo	80 g
Catalizadores	19 g
Saborizantes y aromatizantes	1 g

DESCRIPCIÓN: La sustancia activa de BOROSAN[®] es el Oxígeno "naciente", producido por el perborato sódico en solución acuosa y en contacto con la mucosa bucal.

El oxígeno ejerce acción germicida oxidando los componentes susceptibles del protoplasma bacteriano (probablemente sistemas enzimáticos que son activos en forma reducida). También los organismos anaerobios son destruidos por una alta concentración de oxígeno en su medio ambiente, y en consecuencia, BOROSAN[®] es bactericida para ellos.

A más de la rapidez con la que se disuelve y produce oxígeno, BOROSAN[®] deja como producto de su descomposición un residuo catiónico de reacción alcalina sumamente benéfico porque neutraliza la acidez característica de la cavidad bucal en estado de infección, putrefacción o fermentación.

La acción oxidante de BOROSAN[®] va acompañada de otra desodorante; de ahí su utilidad para suprimir el mal olor de la boca causado por estos estados patológicos. La efervescencia que produce al liberar oxígeno en la boca, favorece también, por acción mecánica, la remoción de detritus en regiones inaccesibles. Los saborizantes y aromatizantes que contiene, dan al paciente una sensación de agradable frescura.

INDICACIONES: Indicado como auxiliar en el tratamiento de la piorrea, gingivitis y otras infecciones bucales causadas por gérmenes sensibles al oxígeno activo. Como antiséptico bucofaringeo y desodorante en casos de halitosis (mal aliento) debido a fermentación, putrefacción o infección.

MODO DE EMPLEO: Cepillarse a fondo los dientes. Disolver el contenido de un sobre en aproximadamente medio vaso de agua. Inmediatamente hacer circular la solución vigorosamente por toda la boca y por entre los dientes, manteniéndola por un minuto. No tragar la solución y no enjuagarse la boca en media hora.

DOSIS: Salvo criterio del facultativo se harán enjuagues 3 veces al día luego de las comidas principales.

PRECAUCIÓN: No es aconsejable usar por períodos muy prolongados. Suspéndase cuando las causas que originaron su utilización hayan desaparecido.

PRESENTACIÓN: BOROSAN[®] se presenta en sobres de 2 gramos herméticamente sellados, para garantizar la calidad y correcta dosificación.

LAMOSAN

Urbanización John F. Kennedy, Pusuquí.
Calle Paseo del Sol S6-574 y De los Luceros.
Teléf.: 343-0536 / 343-0537
Casilla: 17-17-131.
Quito – Ecuador