

# Interex® Avícola

Reg. SAGAR Q-7804-015

Desparasitante *Interno...*  
y también *Externo*



Es el primer antiparasitario interno y externo a base de Ivermectina, diseñado para que sea soluble en agua para uso en pollo de engorda, pollitas de remplazo, ponedoras y reproductoras.

Interex® Avícola controla los nemátodos intestinales y los parásitos externos como los ácaros y piojos; además controla el escarabajo de la cama, huésped intermediario de las tenias más comunes de las aves, por lo que se establece un control indirecto de las mismas.

Interex® Avícola produce un bloqueo en la transmisión nerviosa de los nemátodos y artrópodos al saturar la sinapsis nerviosa con el neurotransmisor GABA (Acido Gama Amino Butírico) y en un segundo paso, al unirse éste al receptor en forma irreversible, lo que produce parálisis flácida y consecuentemente la muerte del parásito.

Una sola dosis elimina parásitos intestinales (nemátodos) sin producir estrés ni disminución en la producción de huevos.

### **Espectro de acción endoparasitica: Nemátodos:**

***Ascaridia galli*  
*Capillaria sp.***

La dosis única es de 400 mcg/Kg. y en caso necesario se repite a los 15 días.

Control de Parásitos externos:

El tratamiento deberá de ser por dos días.

Espectro de acción ectoparasitica:

**Piojos:**

*Lipeurus caponis*  
*Menacanthus sramineus*  
*Menopon gallinae*

**Acaros:**

*Dermanyssus gallinae*  
*Ornithonyssus sylviarum*

**Escarabajo:**

*Alphitobius diaperinus*

Dosificación:

400 mcg/Kg. durante 2 días consecutivos y repetir el mismo tratamiento en caso necesario a los 15 días.

Modo de empleo:

Para lograr la dosificación requerida, diluir el producto de la siguiente manera:



#### **Indicación**

Parasitosis interna,  
externa y  
escarabajos

#### **Dosis**

400 mcg/Kg.

#### **Dilución**

40 ml de Interex® Avícola  
por cada 1000 kilos  
de peso.



La cantidad total de producto a administrar a la parvada será el resultado del peso de las aves multiplicado por el total de las mismas y dividido entre 25.

$$\frac{\text{Peso promedio de las aves} \times \text{número de aves}}{25} = \text{mililitros a aplicar de Interex® Avícola.}$$

Para asegurar un consumo total del medicamento debe de hacerse una restricción del agua dos horas antes de la administración y diluir el producto en la cuarta parte del consumo total de agua del día. Es preferible medicar en las primeras horas de la mañana.

### Concentración de Interex® Avícola en vísceras y tejidos.

Gallinas sometidas a tratamiento de Interex® Avícola a  
Una dosis de 400 mcg/Kg. oral.

Concentración mcg/Kg. (partes por billón)

Tejido	Día 1	Día 3	Día 8	Día 15
Hígado	G1=ND	G1=ND	G1=ND	G1=ND
	G2=ND	G2=ND	G2=ND	G2=ND
	G3=0.92	G3=ND	G3=ND	G3=ND
	G4=9.7	G4=ND	G4=ND	G4=ND
	G5=1.93	G5=ND	G5=ND	G5=ND
Huevo	G1=ND	G1=4.1	G1=ND	G1=ND
	G2=ND	G2=0.2	G2=ND	G2=ND
	G3=ND	G3=ND	G3=ND	G3=ND
	G4=ND	G4=1.6	G4=ND	G4=ND
	G5=ND	G5=ND	G5=ND	G5=ND
Grasa	G1=5	G1=ND	G1=ND	G1=ND
	G2=22.1	G2=1.8	G2=ND	G2=ND
	G3=68	G3=ND	G3=ND	G3=ND
	G4=50	G4=ND	G4=ND	G4=ND
	G5=47.1	G5=ND	G5=ND	G5=ND
Músculo	G1=ND	G1=ND	G1=ND	G1=ND
	G2=ND	G2=ND	G2=ND	G2=ND
	G3=ND	G3=ND	G3=ND	G3=ND
	G4=ND	G4=ND	G4=ND	G4=ND
	G5=ND	G5=ND	G5=ND	G5=ND

G=Gallina número.ND= No Detectable

# Seguridad

## Produccion y fertilidad:

Varios estudios conducidos en reproductoras livianas con infestacion elevada de *Dermanissus gallinae*, a una dosis de 400 mcg/Kg, no produjo cambios en la producción, fertilidad ni parámetros embrionarios.

## Patología clínica:

Se analizaron 8 hígados de pollitos de un día de edad sometidos a una dosificación única de 400 mcg/Kg de Interex® Avícola. El estudio histopatológico no evidenció cambios en la estructura hepática, en el hepatocito ni el espacio porta, incluyendo sus cuatro estructuras. (Arteria, Vena hepatica, Ducto linfatico y Biliar).

En tres muestras se reportó un leve infiltrado mononuclear con algunos granulocitos a nivel portal.

## Química Sanguínea:

Análisis de transaminasa (ALT) en aves ponedoras tratadas con Interex® Avícola a una dosis de 400 mcg/Kg

Días post-administración	Muestra	ALT (u/L)
1	G1	4
2	G2	2
3	G3	6
8	G4	3
15	G5	7.5

G=Gallina

Rango normal: ALT (u/L): 2-10

## Resultados efectivos

### Parásitos externos:

Los estudios realizados demuestran que cuatro aplicaciones en un esquema de dos días seguidos, quince días de descanso y repetición de dos días, disminuyó significativamente la infestación de piojos y ácaros.

### Parásitos Internos:

Una sola aplicación de 400 mcg/Kg de peso disminuyó el promedio de huevecillos por gramo de heces de *Ascaridia spp* y *Capillaria spp* en ponedoras comerciales de un promedio de 767 a menos de 50. (En el caso de *Heterakis* los resultados son medianamente aceptables)

Más del 96% de eficacia, sin someter a stress a las aves y sin costo incremental de mano de obra.



### Advertencia:

Interex® Avícola es una formulación especial y técnicamente diseñada unicamente para vía oral, no se administre por ninguna razón por vía intramuscular o subcutánea. El color azul del producto es parte de la formulación, si no es color azul no lo acepte.

Fórmula Hidromiscible

## Concentración de Interex® Avícola en vísceras y tejidos.

Gallinas sometidas a tratamiento de Interex® Avícola

Aplicando dos dosis de 400 mcg/Kg. oral.

Concentración mcg/Kg. (partes por billón)

Tejido	Gallina número	Día	Partes por Billón
Hígado	1	24 hr. 1ª dosis	1.7
	2	24 hr. 1ª dosis	N.D.
	1	24 hr. 2ª dosis	N.D.
	2	24 hr. 2ª dosis	N.D.
Músculo	1	24 hr. 1ª dosis	N.D.
	2	24 hr. 1ª dosis	N.D.
	1	24 hr. 2ª dosis	N.D.
	2	24 hr. 2ª dosis	N.D.
Grasa	1	24 hr. 1ª dosis	5.0
	2	24 hr. 1ª dosis	1.1
	1	24 hr. 2ª dosis	4.5
	2	24 hr. 2ª dosis	N.D.
Huevo en Oviducto	1	24 hr. 1ª dosis	1.9
	2	24 hr. 1ª dosis	1.4
	1	24 hr. 2ª dosis	N.D.
	2	24 hr. 2ª dosis	N.D.
Huevo	1	24 hr. 1ª dosis	ND
	2	24 hr. 2ª dosis	N.D.

G=Gallina numero. ND= No Detectable

## Concentración de Interex® Avícola en heces fecales.

Gallinas sometidas a tratamiento de Interex® Avícola

Aplicando una dosis de 400 mcg/Kg. oral.

Concentración mcg/Kg. (partes por billón)

Muestra	Gallina Número	Horas Transcurridas	Partes por billón (PPB)
Heces	1	24	802.2
	2	24	210.8
	1	72	158.6
	2	72	124.9
	1	144	6.3
	2	144	17.8
	1	168	1.8
	2	168	0.5

Tiempos de eliminación:

Carne (Pollo de engorda): 8 días

Huevo (ponedoras): 0 días.

Le  
**INTEREX***a*?

Consulte con el distribuidor autorizado de Schütze-Segen



**Schütze-Segen**

Sanctorum 86-A Col Nueva Argentina  
México, D.F. C.P. 11230 México D.F.  
Tel.: 53 99 1751 Fax: 53 99 37 02

**LAQUINSA**

SAN JOSE, COSTA RICA  
DIVISION SALUD ANIMAL