

ALTO, LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO

Lea cuidadosamente las instrucciones del producto. Use el equipo de protección adecuado y completo necesario para realizar con seguridad las operaciones de manejo, preparación y aplicación del producto (gorra, overol de algodón, cubrebocas, goggles o lentes de tipo químico, guantes y botas de neopreno). Mezcle los preparativos con un removedor, nunca con las manos, aunque tenga los guantes puestos. No coma, beba, ni fume durante las aplicaciones. No se aplique contra el viento. Después de un día de trabajo, lave perfectamente el equipo de protección y aplicación (en el mismo campo tratado), con detergente y una solución alcalina como lejía. Báñese cuidadosamente y póngase ropa limpia.

PRECAUCIONES DURANTE EL MANEJO DEL PRODUCTO

“NO COMA, BEBA O FUME CUANDO ESTE UTILIZANDO ESTE PRODUCTO”

“NO SE TRANSPORTE NI ALMACENE JUNTO A PRODUCTOS ALIMENTICIOS, ROPA O FORRAJES”

“MANTÉNGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS, MUJERES EMBARAZADAS, EN LACTANCIA Y ANIMALES DOMÉSTICOS”

“LÁVESE LAS MANOS DESPUÉS DE UTILIZAR EL PRODUCTO Y ANTES DE CONSUMIR ALIMENTOS”

“NO ALMACENE EN CASAS HABITACIÓN”

“NO USE EL PRODUCTO SIN EL EQUIPO DE PROTECCIÓN ADECUADO”

“LOS MENORES DE 18 AÑOS NO DEBEN MANEJAR ESTE PRODUCTO”

“AL FINAL DE LA JORNADA DE TRABAJO BÁÑESE Y PÓNGASE ROPA LIMPIA”

“NO SE INGIERA, INHALE Y EVÍTESE EL CONTACTO CON LOS OJOS Y PIEL”

“NO MEZCLE O PREPARE EL PRODUCTO CON LAS MANOS, USE GUANTES, USE UN TROZO DE MADERA U OTRO MATERIAL APROPIADO”

“NO DESTAPE LA BOQUILLA CON LA BOCA”

“EN CASO DE INTOXICACIÓN, LLEVE AL PACIENTE CON EL MÉDICO Y MUÉSTRELE ESTA ETIQUETA”

PRIMEROS AUXILIOS

Retire a la persona intoxicada del área contaminada para evitar mayor contacto, recuéstela en un lugar fresco y bien ventilado, cámbiele de ropa, manténgala abrigada y en reposo. Si ha habido contacto con la piel u ojos, lave la parte afectada con abundante agua corriente limpia durante 15 minutos. Si el producto es ingerido, solicite atención médica inmediata; si la persona puede ingerir, dar un vaso de agua; no induzca al vómito aunque es probable que este se presente en forma espontánea, en este caso no debe evitarse. No dar nada por la boca a una persona que se encuentre en estado de inconsciencia.

RECOMENDACIONES AL MÉDICO

Grupo químico: Inorgánicos.

Síntomas de intoxicación: Dermatitis al contacto continuo con la piel. Por ingestión se presenta sensación dolorosa de quemadura en la boca y esófago, diarrea, vómito, anuria, lesión hepática y convulsiones.

Antídoto y tratamiento: Lavado cuidadoso del estómago con carbón medicinal (3 a 5 cucharadas en medio litro de agua) y óxido de magnesio y sulfato de sodio (2 a 3 cucharadas en medio litro de agua).

En caso de intoxicación llamar a los teléfonos de emergencia SINTOX 01 800 0092800; 01 (55) 5598 6659 y 5611 2634 servicio las 24 horas los 365 días del año.

MEDIDAS PARA PROTECCIÓN AL AMBIENTE

DURANTE EL MANEJO DEL PRODUCTO, EVITE LA CONTAMINACIÓN DE SUELOS, RÍOS, LAGUNAS, ARROYOS, PRESAS, CAÑALES O DEPÓSITOS DE AGUA, NO LAVANDO O VERTIENDO EN ELLOS RESIDUOS DE PLAGUICIDAS O ENVASES VACÍOS.

MANEJE EL ENVASE VACÍO Y LOS RESIDUOS DEL PRODUCTO CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LA LEY GENERAL PARA LA PREVENCIÓN Y GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RESIDUOS, SU REGLAMENTO O AL PLAN DE MANEJO DE ENVASES VACÍOS DE PLAGUICIDAS, REGISTRADO ANTE LA SEMARNAT.

EL USO INADECUADO DE ESTE PRODUCTO PUEDE CONTAMINAR EL AGUA SUBTERRÁNEA. EVITE MANEJARLO CERCA DE POZOS DE AGUA Y NO LO APLIQUE EN DONDE EL NIVEL DE LOS MANTOS ACUÍFEROS SEA POCO PROFUNDO (75 CM DE PROFUNDIDAD) Y LOS SUELOS SEAN MUY PERMEABLES (ARENOSOS).

EN CASO DE CAÍDA ACCIDENTAL DEL PRODUCTO, SE DEBERÁ USAR EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL Y RECUPERAR EL PRODUCTO QUE SEA ÚTIL HASTA DONDE SEA POSIBLE, Y LO DEMÁS RECOGERLO EN UN RECIPIENTE HERMÉTICO Y LLEVARLO AL CENTRO DE ACOPIO DE RESIDUOS PELIGROSOS AUTORIZADO MÁS CERCANO.

ESTE PRODUCTO ES EXTREMADAMENTE TÓXICO PARA ANIMALES (PECES, INVERTEBRADOS ACUÁTICOS) Y PLANTAS ACUÁTICAS (ALGAS).

GARANTÍA

Como la aplicación, manejo, transporte y almacenaje de este producto están fuera de nuestro control, **Ingeniería Industrial, S.A. DE C.V.**, no se hace responsable de su uso y solamente garantizamos la composición correcta y el contenido neto.



ÚSESE EXCLUSIVAMENTE EN LOS CULTIVOS Y ENFERMEDADES AQUÍ RECOMENDADOS

INSTRUCCIONES DE USO

¡SIEMPRE CALIBRE SU EQUIPO DE APLICACIÓN!

CUPROX®-58 es un fungicida cúprico de uso agrícola formulado como polvo humectable, recomendado para la prevención y control de las enfermedades fungosas en los cultivos que aquí se indican:

CULTIVO	ENFERMEDAD	DOSIS kg/ha	MODO DE EMPLEO
APIO ACELGA COL HABA (SL)	PECA DE LA HOJA <i>Cercospora sp.</i> MANCHA DE LA HOJA <i>Septoria sp.</i> MANCHA ROSADA <i>Sclerotinia sp.</i>	0.75 – 1.0	Se pueden hacer de 2 a 3 aplicaciones con intervalos de 15 a 30 días.
CACAHUATE (SL)	MANCHA O PECA DE LA HOJA <i>Cercospora personata</i>	0.75 – 1.0	Se pueden hacer de 2 a 3 aplicaciones con intervalos de 15 a 30 días.
CEBOLLA (SL)	MANCHA PÚRPURA <i>Alternaria porri</i> MILDIÚ VELLOSO <i>Peronospora destructor</i>	1.0	Aplicar al inicio de los síntomas.
CHILE (SL)	CERCOSPORA O VIRUELA <i>Cercospora capsici</i> MARCHITEZ <i>Phytophthora capsici</i>	0.75 – 1.0	Iniciar la aplicación cuando la planta tenga un desarrollo de 10 a 12 cm de altura. Repetir a intervalos de 15 a 25 días.
JITOMATE (SL)	TIZÓN TEMPRANO <i>Alternaria solani</i> TIZÓN TARDÍO <i>Phytophthora infestans</i> MANCHA DE LA HOJA <i>Cladosporium fulvum</i>	0.75 – 1.0	Iniciar la aplicación antes que aparezcan los primeros síntomas. Repetir la aplicación a intervalos de 7 a 15 días.
MELÓN SANDÍA PEPINO (SL)	MILDIÚ VELLOSO <i>Pseudoperonospora sp.</i> MANCHA DE LA HOJA <i>Alternaria cucumerina</i> <i>Cercospora sp.</i> ANTRACNOSIS <i>Colletotrichum lagenarium</i>	0.75	No aplicar en variedades sensibles al cobre.
PAPA (SL)	TIZÓN TEMPRANO <i>Alternaria solani</i> TIZÓN TARDÍO <i>Phytophthora infestans</i>	0.75	Iniciar la aplicación antes que aparezcan los primeros síntomas. Repetir la aplicación a intervalos de 7 a 15 días.
VID (SL)	MILDIÚ VELLOSO <i>Plasmopara viticola</i>	0.75 – 1.0	Iniciar la aplicación cuando los brotes tengan de 10 a 20 cm de longitud. Repetir a intervalos de 20 a 30 días.

CULTIVO	ENFERMEDAD	DOSIS g / 100 L de agua	MODO DE EMPLEO
AGUACATERO (SL)	ANTRACNOSIS <i>Colletotrichum gloeosporioides</i> MANCHA DE LA HOJA <i>Cercospora sp.</i>	250	Iniciar las aplicaciones antes de la floración y continuar después de la formación de frutos.
CACAO (SL)	PUDRICIÓN DE LA MAZORCA <i>Phytophthora palmivora</i>	200 – 250	Efectuar de 2 a 3 aplicaciones. Utilizar dosis alta en infestaciones fuertes.
CAFETO (SL)	MANCHA DE HIERRO <i>Cercospora coffeicola</i> MOHO DE HILACHAS <i>Corticium koleroga</i> OJO DE GALLO <i>Omphalia flavida</i> ROYA <i>Hemileia vastatrix</i>	200 – 300	Hacer de 2 a 3 aplicaciones cada 30 días.

CÍTRICOS (SL)	ANTRACNOSIS <i>Colletotrichum gloesporioides</i>	150 – 200	Iniciar antes de la floración y repetir en plena floración.
MANGO (SL)	ANTRACNOSIS <i>Colletotrichum gloesporioides</i>	250	Aplicar antes de la floración y durante el desarrollo de la enfermedad.
MANZANO PERAL (SL)	PUDRICIÓN AMARGA <i>Glomerella cingulata</i> CENICILLA POLVORIENTA <i>Podosphaera leucotricha</i> ROÑA O SARNA <i>Venturia inaequalis</i> TIZÓN DE FUEGO <i>Erwinia amylovora</i> PUDRICIÓN CAFÉ <i>Monilinia fructicola</i>	100 – 150	Utilizar dosis altas antes de la floración y bajas en la floración.
PLÁTANO (SL)	CHAMUSCO <i>Mycosphaerella musicola</i> ANTRACNOSIS <i>Colletotrichum sp.</i>	150 – 200	Iniciar las aplicaciones antes de la floración y continuar después de la formación de frutos.
TABACO (SL)	MANCHA DE LA HOJA <i>Alternaria sp.</i> MOHO AZUL <i>Peronospora tabacini</i>	750 – 1250	Iniciar las aplicaciones antes de presentarse la enfermedad. Alternar con Zineb 80.

() Intervalo de seguridad: Días que deben transcurrir entre la última aplicación y la cosecha.

SL: Sin límite.

Tiempo de reentrada a zonas tratadas: 12 horas.

MÉTODO PARA PREPARAR Y APLICAR EL PRODUCTO

Forma de abrir el envase: Realice el corte al sobre o saco con precaución, utilizando guantes y cubrebocas, evitando el contacto con la piel y ojos.

Preparación: Este producto está formulado como polvo humectable, por lo que para aplicarse debe disolverse la dosis recomendada en la cantidad de agua suficiente para lograr un cubrimiento total y uniforme de las plantas tratadas. Inicie las aplicaciones en forma preventiva, es decir, antes de que aparezcan los síntomas de la enfermedad. Repetir la aplicación a los intervalos indicados y si prevalecen condiciones de temperatura y humedad que favorezcan su desarrollo.

CONTRAINDICACIONES

No aplicar en horas de calor intenso, cuando la velocidad del viento sea alta (mayor a 15 km/h), ni cuando exista alta probabilidad de lluvia próxima. No se aplique en variedades sensibles.

FITOTOXICIDAD

Este producto no es fitotóxico si se utiliza de acuerdo a las recomendaciones de esta etiqueta. Cuando se desconozca la compatibilidad de una mezcla de uso agrícola, deberá hacerse una prueba previa a su aplicación para evitar posibles efectos fitotóxicos.

INCOMPATIBILIDAD

No mezclar con Fenvalerato, Paratión, Clorpirifos y Diclorán, ni con productos de fuerte reacción alcalina. La mezcla con otros productos será con aquellos que tengan registro vigente y que estén autorizados para los cultivos aquí indicados.

MANEJO DE RESISTENCIA

PARA PREVENIR EL DESARROLLO DE POBLACIONES RESISTENTES, SIEMPRE RESPETE LAS DOSIS Y LAS FRECUENCIAS DE APLICACIÓN; EVITE EL USO REPETIDO DE ESTE PRODUCTO, ALTERNÁNDOLO CON OTROS GRUPOS QUÍMICOS DE DIFERENTES MODOS DE ACCIÓN Y DIFERENTES MECANISMOS DE DESTOXIFICACIÓN Y MEDIANTE EL APOYO DE OTROS METODOS DE CONTROL.



