

**LEA CUIDADOSAMENTE ESTA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO.
MANTÉNGASE BAJO LLAVE Y FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.**

PRECAUCIONES:
ESTE PRODUCTO ES CATEGORÍA TOXICOLÓGICA III, LIGERAMENTE PELIGROSO; por lo cual se recomienda observar todas las precauciones necesarias para el manejo y la aplicación de estos plaguicidas. Tóxico para abejas y peces.

GRUPO QUÍMICO:
Neonicotinoides (Cloronicotinílicos).

ANTÍDOTO:
No hay antídoto específico conocido. Aplique tratamientos sintomáticos.

SEGURIDAD PARA EL USUARIO:
No comer, no beber ni fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación. Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado. Después de usar el producto, cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón. Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.

PRIMEROS AUXILIOS:
En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente, o lleve el paciente al médico y muéstrele la etiqueta. Retire al paciente de cualquier contacto adicional con plaguicidas y llévalo a un lugar bien ventilado.

En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua fresca y si el contacto fuese con la piel, lavarse con abundante agua y jabón.
Evite poner el paciente a temperaturas extremas.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA:
CISPROQUIM (24 HORAS) (1) 2886012 EN BOGOTÁ
Y 01 8000 916012 RESTO DEL PAÍS
TELÉFONO DEL TITULAR DEL REGISTRO:
SAAT ANDINA S.A. (1) 864 3342 CELULAR: 311 5329583

Contacto con la piel: Quite ropa y calzado contaminados y lave con abundante agua y jabón durante mínimo 15 minutos. Reciba atención médica en caso de irritación.

Contacto con los ojos: Lave abundantemente con un chorro de agua pura durante 15 minutos, manteniendo los párpados abiertos. Reciba atención médica en caso de irritación.

Inhalación: Trasladar al aire fresco. Si no respira, administrar respiración artificial. Si respira con dificultad, administrar oxígeno.

Nota: Nunca suministre nada por vía oral a un paciente inconsciente.

AMBIENTE:
No contamine fuentes de agua (canales de riego, lagos, lagunas, quebradas, ríos, cascadas, canales de drenaje, etc.) con los sobrantes de la aspersión.

Las áreas aplicadas no deben ser pastoreadas, ni cosechadas, antes de que pase el PC (Intervalo de seguridad entre la última aplicación y la cosecha).

Ningún envase que haya contenido este producto deberá utilizarse para conservar alimentos o agua potable.

Triple lavado: Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo triturándolo o perforándolo y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.

ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE:

Mantener el producto en el envase original, etiquetado y cerrado, en un lugar seguro, seco y fresco, FUERA DEL ALCANCE DE NIÑOS, PERSONAS IRRESPONSABLES Y ANIMALES DOMÉSTICOS. No transporte ni almacene con productos de uso humano o pecuario. Evite almacenar a temperaturas por encima de 35° C. No almacenar en casas de habitación.

Derrames: recójalos con algún material absorbente (por ejemplo aserrín), colóquelos en una bolsa plástica y deposítelos en el lugar destinado por las autoridades locales para tal fin (lejos de fuentes de agua, cultivos o zonas habitadas).



Saat Fandango® 350 SC

INSECTICIDA DE USO AGRÍCOLA

Suspensión Concentrada (SC)

Registro Nacional ICA No. 0013

Titular del Registro: Saat Andina S.A.

COMPOSICIÓN GARANTIZADA

Ingrediente Activo: Imidacloprid: 1-(6-cloro-3-piridilmetil)-N-nitroimidazolidina -2-ilideneamaina. 350 g/l a 20° C

Ingredientes Aditivos c.s.p. 1 litro

IMPORTADO Y DISTRIBUIDO POR: SAAT ANDINA S.A. **CONTENIDO NETO: 1 LITRO**

SAAT
SAAT ANDINA S.A.
Autopista Medellín Km. 1,5 PAO L-21
Bogotá - Cota, COLOMBIA.
Tel.(1).864 33 42 Fax.(1) 864 30 51

LOTE No:

FECHA DE FABRICACIÓN:

FECHA DE VENCIMIENTO:

© Marca Registrada Saat AG, Delémont, Suiza.

INDICACIONES GENERALES

Consulte con un Ingeniero Agrónomo

CAMPOS DE APLICACIÓN, USOS Y DOSIS:

Cultivo	Enfermedad	Dosis (l/ha)	P. C. (Días)
Algodón	Pulgones: <i>Aphis gossypii</i>	0.2 - 0.3	30
Arroz	Sogata, Salta hojas: <i>Tagosodes orizicolus</i>	0.1 - 0.15 g	30
Pastos	Chinche: <i>Collaria zenica</i>	0.15 o	21
Resaca y Crisantemo	Áfidos y Pulgón: <i>Macrosiphoniella sanborni, Macrosiphon euphorbiae, Mizus persicae</i>	0.25 - 0.3	
Tomate*		0.6 - 0.8	7
Tabaco*	Mosca blanca: <i>Trialeurodes vaporariorum</i>	0.6 - 0.8	
	Mosca blanca: <i>Trialeurodes vaporariorum</i>		

PC.: Período de Carenia.

Dosis: ①15 días después de pastoreo o en la aparición de los primeros instares ninfales. ②Aplicación en estados tempranos del arroz, primeras infestaciones de la plaga.

*Se recomienda hacer una secuencia de aplicaciones así: Aplicar en semillero con regadera a los 8-12 días antes del trasplante, a dosis de 1 cc de producto en 1 litro de agua por m² de semillero. Aplicar planta por planta en "Drench" a los 10-12 días después del trasplante a dosis de 0.6 - 0.8 litro de producto/ha. Aspersión foliar de acuerdo al nivel de infestación en dosis de 0.6 - 0.8 l/ha. Se debe aplicar cuando el nivel de infestación lo justifique, es decir cuando se haya alcanzado el nivel de umbral económico.

MODO DE ACCIÓN:

Es un insecticida con acción de contacto e ingestión sobre los insectos y expelente/absorción a través del sistema radicular de las plantas. Actúa sobre el sistema nervioso central causando bloqueo irreversible de los receptores nerviosos. Está recomendado para el control de plagas en cultivos de algodón, arroz, ornamentales, tomate, tabaco y pastos.

MODO DE EMPLEO:

Cuando se aplique en forma aérea, debe tenerse mucho cuidado con el bandereo para evitar áreas sin aplicación, las cuales se convierten en focos de reinfestación. El lote, durante el monitoreo, debe ser recorrido en forma de diagonales de manera que la infestación pueda ser claramente detectada. Debe ser aplicado por vía aérea disuelto entre 20 y 38 litros de agua por hectárea, de acuerdo con el volumen de producto recomendado para cada plaga en particular. La temperatura y humedad del viento pueden tener un efecto importante sobre la cantidad y la uniformidad de producto dentro del cultivo. Precauciones en la aplicación: No aplicar cuando la temperatura exceda 36° C. No aplicar cuando la humedad relativa sea inferior a 55%. No aplicar cuando la velocidad del viento exceda 5.5 m/seg. (20 Km/hora). Durante las aplicaciones, el personal de tierra debe estar fuera de la línea de vuelo.

COMPATIBILIDAD:

Puede ser mezclado con otros insecticidas de reacción no alcalina. Para mezclarlos con otros productos que permiten ampliar el espectro de acción y/o reducir el riesgo de desarrollo de resistencia, debe consultarse un Ingeniero Agrónomo. Antes de hacer aplicaciones masivas en mezclas con otros productos, es recomendable hacer pruebas en pequeña escala para verificar la compatibilidad física.

INFORMACIÓN SOBRE RESPONSABILIDAD:

El titular del registro garantiza que las características físico-químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.



CUIDADO

