

SOLUCIÓN VLEMINCKX Y PASTA DE DIÓXIDO DE TITANIO

INFORMACIÓN AL PACIENTE

COMPOSICIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVA

FORMA FARMACÉUTICA: Pasta.

DOSIS UNITARIA: Cada gramo del preparado contiene miligramos de azufre precipitado, miligramos de agua de cal, miligramos de tween-20, miligramos de talco, miligramos de titanio dióxido, miligramos de glicerina, miligramos de alcohol alcanforado y miligramos de agua destilada.

NÚMERO DE DOSIS:

INDICACIONES: Pasta astringente y ligeramente antiséptica utilizada en el tratamiento de pieles seborréicas y acnéicas.

VÍA DE ADMINISTRACIÓN: Tópica. Aplicar éste preparado sobre la piel.

POSOLOGÍA: **Según indicación médica.**

Posología USUAL y NORMAS PARA LA CORRECTA ADMINISTRACIÓN: Siga estrictamente las dosis y pautas (modo de empleo y duración del tratamiento) indicadas por su médico. Salvo distinto criterio médico aplicar durante 20 minutos y retirar con agua templada, una vez al día la primera semana, en días alternos la segunda, el número de aplicaciones se irá reduciendo progresivamente hasta llegar a dos por semana. Realizar las aplicaciones después de lavar a fondo y secar bien la zona a tratar; esperar unos 30 minutos antes de utilizar el preparado para evitar irritaciones. Aplicar con cuidado en zonas próximas a ojos y mucosas. El preparado deja un residuo blanco sobre la piel. No utilizar otros medicamentos antiacnéicos o jabones tratantes sin consultar a su médico.

CONTRAINDICACIONES: Hipersensibilidad a alguno de sus componentes. Debido a su poder astringente no debe utilizarse en pieles secas; por el mismo motivo puede producir sensación de tirantez en la piel después de su aplicación. No utilizar otros antiacnéicos o jabones tratantes sin consultar con su médico.

EMBARAZO Y LACTANCIA: No es probable que se produzcan problemas.

SOLUCIÓN VLEMINCKX Y PASTA DE DIÓXIDO DE TITANIO

INFORMACIÓN AL PACIENTE

EFFECTOS SECUNDARIOS: Puede producir sensación de tirantez en la piel después de su aplicación, así como rubefacción en cutis muy sensibles.

CONSERVACIÓN:

Conservar en ambiente seco y fresco (menor a 25° C)

Proteger del calor y luz directa.

Mantener el envase bien cerrado y lejos del alcance de los niños.

CADUCIDAD ESTIMADA: 6 meses.

SOBREDOSIS:

La intoxicación por éste medicamento, a las dosis recomendadas, es improbable.

En caso de sobredosis o ingestión accidental acudir a un centro médico, indicando el producto y la cantidad ingerida o consultar en INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA: 91-5620420 (24 horas).

NOMBRE, DIRECCIÓN Y TELÉFONO DE LA FARMACIA DISPENSADORA:

.....
.....
.....
.....
.....
.....

ANTES DE USAR SU MEDICACIÓN, CONSULTE A SU FARMACÉUTICO SI:

- Tiene dudas en cuanto a la dosis o pauta de administración.
- Está tomando otros medicamentos (también anticonceptivos orales).
- Es alérgico a algún medicamento o sustancia.
- Padece alguna enfermedad crónica: diabetes; hipertensión; úlcera gastroduodenal; glaucoma; epilepsia; insuficiencia hepática, renal, cardíaca o respiratoria; etc.
- Está embarazada o podría estarlo.
- Está en periodo de lactancia.
- Desea información sobre efectos secundarios, contraindicaciones o cualquier otra cuestión relacionada con su tratamiento.