

DERBY 10,6% SL



Herbicida sistémico de pre y postemergencia
Líquido

COMPOSICIÓN:

Imazetapir 106 g/l

MECANISMO DE ACCIÓN: DERBY 10,6% SL, es absorbido rápidamente por el follaje y las raíces de las malezas, se trasloca por el Xilema y el Floema, acumulándose en los tejidos meristemáticos de éstas. Las malezas dejan de crecer debido a la inhibición de la enzima acetohidroxiácida sintetasa, a la disminución de los niveles de aminoácidos esenciales: Valina, Leucina, e Isoleucina y a la interrupción de la síntesis proteica, interfiere en la síntesis del ADN. La detención del crecimiento de las malezas y de competencia sobre el cultivo ocurre dentro de los dos días siguientes a su aplicación y la posterior muerte ocurre a las 4 - 8 semanas. **DERBY 10,6% SL**, es un herbicida de pre y postemergencia temprana, para el control de malezas de hoja ancha y algunas gramíneas, con acción residual que mantiene limpio su cultivo hasta la cosecha en cultivos de Soya, Alfalfa y Maní.

MODO DE EMPLEO: No aplicar cuando el cultivo esté bajo estrés hídrico. Puede causar amarillamiento inicial en el cultivo, que es recuperable y no tiene efectos en los rendimientos finales. El producto posee una vida media de aproximadamente 3 meses en el suelo y agua. Tomar las precauciones debidas cuando el cultivo siguiente no sea una leguminosa.

COMPATIBILIDAD: DERBY 10,6% SL no debe mezclarse con herbicidas postemergentes.

TOXICIDAD: Categoría Toxicológica IV.

PRESENTACIÓN:

Envase x 1 litro.

DISTRIBUIDO POR: FARMAGRO.

RECOMENDACIONES DE USO DE DERBY 10,6% SL:

CULTIVOS	MALEZAS	DOSIS	OBSERVACIONES
SOYA (<i>Glycine max</i>)	Bledo, Rábano, Tomatillo, Enredadera, Verdolaga, Manzanilla.	1 l/ha	Aplicar a partir de la 2 ^{da} y 3 ^{ra} hoja trifoliada del cultivo con malezas en sus primeros estados de desarrollo y en activo crecimiento.
MANÍ (<i>Arachis pinto</i>)	Bledo, Rábano, Tomatillo, Enredadera, Verdolaga, Manzanilla.	1 l/ha	Aplicar a partir de la 2 ^{da} y 3 ^{ra} hoja trifoliada del cultivo con malezas en sus primeros estados de desarrollo y en activo crecimiento.
ALFALFA (<i>Medicago sativa</i>)	Bledo, Rábano, Tomatillo, Enredadera.	1 l/ha	Aplicar a partir de la 2 ^{da} y 3 ^{ra} hoja trifoliada del cultivo con malezas en sus primeros estados de desarrollo y en activo crecimiento.