

SCORE® 250 EC




Fungicida

Concentrado emulsionable EC

ACCIÓN FITOSANITARIA: SCORE® 250 EC es un fungicida sistémico del grupo de los triazoles que provee un duradero efecto preventivo y un fuerte control curativo y erradicativo en una amplia gama de enfermedades producidas por Ascomicetos, Basidiomicetos y Deuteromicetos en varios cultivos.

NOMBRE COMÚN: Difenconazole.

FORMULACIÓN Y CONCENTRACIÓN: Concentrado emulsionable, que contiene 250 g de ingrediente activo por litro de producto comercial.

MODO DE ACCIÓN: SCORE® 250 EC es un fungicida sistémico con acción de contacto, aún cuando el modo de acción tiene características tanto protectantes como curativas y erradicativas. Se recomienda aplicarlo cuando aparezcan los primeros síntomas de la enfermedad.

MECANISMO DE ACCIÓN: El Difenconazole, ingrediente activo de SCORE® 250 EC es rápidamente absorbido por la planta y actúa sobre el crecimiento subcuticular de las ninfas.

MODO DE EMPLEO: Llenar el tanque con la mitad del agua a aplicar, empezar a agitar y simultáneamente echar la cantidad del producto a utilizar, agitar bien hasta obtener una mezcla homogénea y finalmente completar la cantidad de agua. Continuar agitando durante la aspersión.

MARGEN DE SEGURIDAD: La máxima absorción se alcanza en 2 horas. La concentración del producto en la planta permanece más o menos estable por un período de 21 días. La cantidad de absorción varía entre las diferentes especies de plantas.

SCORE® 250 EC es absorbido fuertemente por la fase orgánica del suelo y su índice de lixiviación es 1, considerándose inmóvil.

FRECUENCIA DE APLICACIÓN: Para cucurbitáceas 7-14 días; hortalizas, tratamiento preventivo; mango 10-14 días; manzana y pera en pre-floración, floración y después de la floración de 7-18 días.

PERIODO DE REINGRESO: 12 horas.

COMPATIBILIDAD: Puede ser mezclado con la mayoría de los agroquímicos comúnmente usados. En caso de duda, se recomienda efectuar una prueba previa de compatibilidad.

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN:

- No ingerir el producto. No inhalar la nube de aspersión.
- Irritante para los ojos, la piel y sistema respiratorio. Evitar el contacto del producto con la piel, boca y ojos.
- No comer, beber o fumar durante la preparación y utilización del producto.
- Usar ropa protectora adecuada, por ejemplo guantes, delantal, overol, botas, tapaboca y careta de protección.
- Antes de comer, beber o fumar sacarse la ropa contaminada y lavarse bien las partes expuestas de la piel con abundante agua.

FRASES DE ADVERTENCIA:

- Muy tóxico para organismos acuáticos. No aplicar el producto en las superficies que puedan entrar en contacto con alimentos.
- Conservar el producto en su envase original, etiquetado y cerrado herméticamente.
- No emplear este envase para ningún otro fin.
- El producto es inflamable a altas temperaturas. Evite almacenar el producto con temperaturas menores a 0 °C y superiores a 35 °C.
- Conservar el envase en un lugar seguro, lejos de los alimentos

de los niños y los animales.

- No re-ensavar o depositar el contenido en otro envase.
- Después de usar el contenido, enjuagar tres veces este envase y verter la solución en la mezcla de aplicación, inutilizar el envase triturándolo o perforándolo y depositarlo en un lugar destinado por las autoridades locales para este fin.
- Mantener limpio y en buenas condiciones el equipo utilizado para la aplicación, cuidando de que no se produzcan escapes ni contaminación externa.
- No aplicar el producto directamente sobre el ganado, el pienso o los depósitos de agua.
- En caso de derrame, absorber con arena, tierra u otro material absorbente y colocar los residuos en un recipiente adecuado para su eliminación y dispóngalos en un lugar de acuerdo a la normativa local.

PRIMEROS AUXILIOS Y CONSEJOS PARA LOS MÉDICOS:

- En caso de intoxicación llamar al médico inmediatamente o llevar al paciente al médico y mostrarle la etiqueta.
- En caso de ingestión, administrar repetidamente carbón activado en grandes cantidades de agua. No inducir al vómito. Nada debe darse por la boca a una persona inconsciente. Lleve al paciente al médico.
- En caso de contacto con la piel, retirar la ropa contaminada y lavar las partes del cuerpo afectadas con abundante agua y jabón, incluso el cabello y debajo de las uñas.
- En caso de contacto con los ojos, enjuagarlos con agua limpia durante varios minutos. Lleve al paciente al médico.
- En caso de inhalación, retirar al paciente del lugar de exposición; mantenerlo caliente y en reposo. Como precaución, obtener atención médica.

SÍNTOMAS: Irritación, mareo, náuseas.

TRATAMIENTO: No se conoce antídoto específico, por consiguiente el tratamiento es sintomático. Si se considera necesario un lavado gástrico, prevenga la aspiración de los contenidos gástricos.

TOXICIDAD: Categoría Toxicológica III. Ligeramente peligroso.

DL₅₀ Oral rata: 3 442 mg/kg

DL₅₀ Dermal rata: 2 000 mg/kg

EN CASO DE EMERGENCIA LLAMAR A CISPROMQUIM: 1800593005 A NIVEL NACIONAL, CIATOX: 1800 836366 A NIVEL NACIONAL O CITOX: 042451022.

Para mayor información llamar a ECUAQUÍMICA a los teléfonos (593-4) 268-2050 en Guayaquil o al (593-2) 286-1690 en Quito.

PRESENTACIONES:

Frasco x 50 ml.

Frasco x 100 ml.

Frasco x 250 ml.

Frasco x 1 litro.

Caneca x 20 litros.

REGISTRO N°: 067-F

TITULAR DEL REGISTRO: SYNGENTA CROP PROTECTION S.A.

DISTRIBUIDO POR: ECUAQUÍMICA.

INSTRUCCIONES DE USO DE SCORE® 250 EC:

CULTIVO	PLAGAS		DOSIS (l/ha)
	NOMBRE COMÚN	NOMBRE CIENTÍFICO	
AJO, CEBOLLA (<i>Allium</i> spp.)	Mancha de la hoja	<i>Alternaria porri</i>	0.5 - 0.7
MELÓN (<i>Cucumis melo</i>) SANDÍA (<i>Citrullus vulgaris</i>)	Antracnosis	<i>Colletotrichum</i> sp.	0.3 - 0.5
FRÉJOL (<i>Phaseolus vulgaris</i>)	Antracnosis	<i>Colletotrichum</i> sp.	0.3 - 0.5
	Roya	<i>Uromyces</i> sp.	
PAPA (<i>Solanum</i> sp.) TOMATE (<i>Lycopersicon</i> sp.)	Tizón temprano	<i>Alternaria</i> sp.	0.2 - 0.3
	Mancha foliar	<i>Septoria</i> sp.	
HORTALIZAS APIO (<i>Apium</i> sp.) ARVEJA (<i>Pisum</i> sp.) COL (<i>Brassica</i> sp.) ESPÁRRAGO (<i>Asparagus</i> sp.) PIMIENTO (<i>Capsicum</i> sp.)	Mancha de la hoja	<i>Alternaria</i> sp.	0.3 - 0.5
	Cercosporiosis	<i>Cercospora</i> sp.	
MANZANA (<i>Malus comunis</i>) PERA (<i>Pyrus</i> sp.) MANGO (<i>Mangifera</i> sp.)	Antracnosis	<i>Colletotrichum</i> sp.	0.4 - 1.0
	Sarna	<i>Venturia</i> sp.	
ORNAMENTALES ROSA (<i>Rosa</i> sp.) CLAVEL (<i>Dianthus</i> sp.)	Moho gris	<i>Botrytis cinerea</i>	120 - 160 cm ³ en 200 l de agua
	Alternaria	<i>Alternaria</i> sp.	
	Septoria	<i>Septoria</i> sp.	
	Mancha anillada	<i>Heterosporium</i> sp.	
	Mildiu polvoso	<i>Oidium</i> sp.	0.8
MARACUYÁ (<i>Passiflora edulis</i>)	Antracnosis	<i>Colletotrichum gloeosporioides</i>	0.3
BRÓCOLI (<i>Brassica oleracea</i> var. <i>botrytis</i> , subvar. <i>cymosa</i>)	Alternaria	<i>Alternaria brassicae</i>	0.3-0.4
TOMATE DE ÁRBOL (<i>Solanum betaceum</i>)	Antracnosis	<i>Colletotrichum gloeosporioides</i>	0.25-0.5