

Intrepid™ 2F

Eiqueta Web - Ecuador

INSECTICIDA AGRÍCOLA SUSPENSIÓN CONCENTRADA - SC

**“LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO”
“CONSERVESE EN LUGAR CERRADO FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”**

INGREDIENTE ACTIVO:

Methoxyfenozide 240 g/l

**INSECTICIDA QUE INTERFIERE EL PROCESO DE MUDA
EN LARVAS DE LEPIDÓPTEROS**

Reg. M.A.G.: 105-I 1-SESA-U

Titular de Registro: Consultimz Cia. Ltda. Representante para Ecuador de Dow AgroSciences de Colombia S.A.

**“ESTE INSECTICIDA ESTÁ SUJETO A LOS REQUISITOS SEÑALADOS
EN LA LEY 073 REGISTRO OFICIAL 442 DE DE 1990 - 05 - 22”**

FABRICADO POR :

Dow AgroSciences de Colombia S.A.
Diagonal 92 No. 17A - 42 Piso 7°
Bogotá (57 1) 2196000

DISTRIBUIDO POR:

Interoc S.A.
Vía a Daule Km 16,5
Tel: 2881662. Guayaquil, Ecuador



Dow AgroSciences

INTEROC @ CUSTER

® TM Marca de The Dow Chemical Company
("Dow") o una compañía afiliada de Dow

P.V.P.

CUIDADO

Intrepid™ 2F

Eiqueta Web - Ecuador

INSECTICIDA AGRÍCOLA SUSPENSIÓN CONCENTRADA - SC

MODO DE EMPLEO:

Antes de usar **Intrepid™ 2F** agitarlo adecuadamente mientras está cerrado. **Intrepid™ 2F** es un insecticida que imita la hormona natural de la muda de los insectos, ecdisoma, en el control de larvas de LEPIDÓPTEROS. Hacer las aplicaciones sobre larvas en estados L1 a L3. La adición de un humectante asegura un mejor cubrimiento y adherencia del producto en las hojas.

INSTRUCCIONES DE USO

Intrepid™ 2F controla únicamente larvas de Lepidópteros que atacan diferentes cultivos, no tiene acción sobre las especies de benéficos como avispas, libélulas y arañas. Las larvas tratadas dejan de comer a las 24 horas, no pueden deshacerse de su vieja muda y mueren por deshidratación e inanición a partir de las 72 horas. Debido a su alta selectividad para insectos benéficos, es recomendado en el Manejo Integrado de Plagas (MIP).

RECOMENDACIONES

CULTIVOS	INSECTO	DOSIS	FRECUENCIA	P.C.	P.R.
ARROZ (<i>Oryza sativa</i>)	Langosta (<i>Spodoptera frugiperda</i>)	80-100 cc/ha	Con 20% de plantas afectadas.	14 días	24 horas
MANGO (<i>Mangifera indica</i>)	Gusano medidor (<i>Pleuroprucha asthenaria</i>)	300 cc/ha	A inicio de floración con presencia de la plaga. De 1 a 3 aplicaciones por ciclo, cada 14-21 días en caso de que se requiera.	3 días	24 horas
BRÓCOLI (<i>Brassica oleracea var. botrytis subvar. cymosa</i>)	Plutella (<i>Plutella xylostella</i>)	1 cc / l de agua		1 día	24 horas

P.C.: Período de carencia.

P.R.: Período de reentrada.

ÚLTIMA APLICACIÓN:

No tiene restricciones.

COMPATIBILIDAD:

Es compatible en mezcla con Propanil usado en arroz.



Intrepid™ 2F

Eiqueta Web - Ecuador

INSECTICIDA AGRÍCOLA SUSPENSIÓN CONCENTRADA - SC

AVISO AL COMPRADOR:

El titular del registro garantiza la composición y calidad del producto. No se responsabiliza por el uso imprudente, excesivo o indebido por parte del aplicador.

PRODUCTO LIGERAMENTE PELIGROSO
Categoría Toxicológica III



Intrepid™ 2F

Eiqueta Web - Ecuador

INSECTICIDA AGRÍCOLA SUSPENSIÓN CONCENTRADA - SC

Precaución: Intrepid™ 2F puede ser **MORTAL** si se ingiere. **VENENOSO** si se inhala.

Durante la preparación y utilización del producto:
NO FUMAR - COMER O BEBER

Evitar la inhalación de la sustancia nebulizada así como el contacto del producto con la boca, la piel y los ojos. **USAR** traje protector adecuado, guantes, mascarilla, botas y gafas. En caso de contaminación lavarse las manos y partes expuestas de la piel.

Antes de **COMER-BEBER O FUMAR**, sacarse la ropa contaminada y lavarse bien las partes expuestas de la piel con abundante agua.

FRASES DE ADVERTENCIA

Peligroso para animales domésticos, la fauna y flora silvestres. **NO** emplear este envase para ningún otro fin. Antes de destruir el envase enjuagarlo con agua (cuarta parte del contenido) por lo menos tres veces y los residuos viértalos en el equipo de aplicación. En caso de derrame, absorba y recoja con aserrín o tierra seca y disponga de la forma autorizada por la autoridad local (ver teléfono de Emergencia Química). Mantener limpio y en buenas condiciones el equipo utilizado en las aplicaciones, cuidando que no se produzcan escapes ni contaminación externa.

INSTRUCCIONES PARA PRIMEROS AUXILIOS Y CONSEJOS PARA LOS MÉDICOS

En caso de **INHALACIÓN**, retirar a la persona afectada del área contaminada y mantenerla en reposo.

En caso de **CONTACTO CON LOS OJOS**, lavar inmediatamente con abundante agua, remover la ropa contaminada.

En caso de **INGESTIÓN**, dar a beber 2 vasos de agua, consultar con el médico y mostrar la etiqueta.

LOS SÍNTOMAS pueden consistir en anemia moderada degenerativa por ingestión accidental. **Intrepid™ 2F** sin diluir puede causar ligera irritación de la piel.

EL DIAGNÓSTICO, puede confirmarse por ligeras irritaciones dérmicas o por procesos anémicos para casos de ingestión.

TRATAMIENTO. No hay antídoto específico contra **Intrepid™ 2F**. Se sugiere lavado gástrico. Tratamiento sintomático.

Para mayor información diríjase a **INTEROC S.A.**
Vía a Daule Km 16,5. Tel: 2881662.
Guayaquil, Ecuador.

