

# Rally™ 40 PM

## Eiqueta Web - Ecuador

FUNGICIDA AGRÍCOLA POLVO MOJABLE - PM

### CUIDADO

**"LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"**  
**"CONSERVESE EN LUGAR CERRADO FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"**

#### Ingrediente Activo:

Myclobutanil ..... 400 g/kg

FUNGICIDA SISTÉMICO PARA CONTROL DE OIDIUM EN ROSAS  
Y DE LA PUDRICIÓN DE CORONA EN BANANO

Reg. M.A.G.: 085-F1- SESA-U

Titular de Registro: Consultimz Cia. Ltda. Representante para Ecuador de Dow AgroSciences de Colombia S.A.

**"ESTE FUNGICIDA ESTÁ SUJETO A LOS REQUISITOS SEÑALADOS  
EN LA LEY 073 REGISTRO OFICIAL 442 DE 1990 - 05 - 22"**

#### FABRICADO POR:

**Dow AgroSciences LLC**  
Indianápolis - Indiana. U.S.A.

**Dow AgroSciences de Colombia S.A.**

Transversal 18 No. 96 - 41 Piso 7o. Tel: (571) 2196000  
Bogotá D.C. - Colombia

#### DISTRIBUIDO POR:

**INTEROC S.A.**

Km 16.5 Vía Daule  
Telf. 593 4 288-1662  
Guayaquil, Ecuador



**Dow AgroSciences**

**INTEROC @ CUSTER**

® TM Marca de The Dow Chemical Company  
("Dow") o una compañía afiliada de Dow

P.V.P.

**CUIDADO**

# Rally™ 40 PM

## Eiqueta Web - Ecuador

**FUNGICIDA AGRÍCOLA POLVO MOJABLE - PM**

### MODO DE EMPLEO:

Utilizar **Rally™ 40 PM** con equipos que permitan una buena cobertura de las plantas, con gotas de tamaño fino, y preferentemente usando boquillas de cono. Para mejorar la cobertura y distribución del producto se recomienda el uso de **Kaytar™ ACT** al 0,25%. Alternar las aplicaciones de **Rally™ 40 PM** con fungicidas de diferente modo de acción.

### PREPARACIÓN DE LA MEZCLA:

Adicionar la dosis total de **Rally™ 40 PM** al tanque de aspersión conteniendo la mitad de agua a usar, mientras se agita continuamente; completar luego, el resto de agua. En caso de mezclas con otros productos, realizar pruebas previas de compatibilidad.

**Rally™ 40 PM** es un fungicida sistémico con propiedades protectoras y curativas contra cenicilla polvoriento de la vid y manzano, enfermedades post-cosecha de frutales y Oidium de las rosas. **Rally™ 40 PM** se absorbe rápidamente y mata al hongo hasta 4 días después de haberse iniciado la infección.

### INSTRUCCIONES PARA EL USO:

CULTIVO	ENFERMEDAD	DOSIS	RECOMENDACIÓN
Rosas <i>Rosa sp</i>	Mildiu polvoriento <i>Oidium sp.</i>	10-15 g /100 L de agua	Iniciar aplicación a los primeros síntomas
Banano <i>Musa sp</i>	Pudrición de corona <i>Fusarium moniliforme</i> <i>F. semitectum</i>	Mercado Americano 250-350 p.p.m.	250 para épocas de baja presión 350 para épocas de alta presión
		Mercado Europeo 300-400 p.p.m.	300 para épocas de baja presión 400 para épocas de alta presión

### FRECUENCIA DE APLICACIÓN:

**ROSAS:** Cada 7-14 días según presión de la enfermedad.

### APLICACIÓN EN BANANO:

Post-cosecha.



# Rally™ 40 PM

## Eiqueta Web - Ecuador

FUNGICIDA AGRÍCOLA POLVO MOJABLE - PM

**INTERVALOS DE SEGURIDAD:**

Sin restricciones.

**ÚLTIMA APLICACIÓN:**

Sin restricción.

**COMPATIBILIDAD:**

Si no se conoce la compatibilidad de mezclas, hacer pruebas previas.

**AVISO AL COMPRADOR:**

El fabricante garantiza la composición y calidad del producto. No se responsabiliza por el uso imprudente excesivo o indebido por parte del consumidor.

**PRODUCTO LIGERAMENTE PELIGROSO**  
Categoría Toxicológica III



# Rally™ 40 PM

## Eiqueta Web - Ecuador

**FUNGICIDA AGRÍCOLA POLVO MOJABLE - PM**

**Precaución: Rally™ 40 PM puede ser MORTAL si se ingiere. VENENOSO si se inhala.**

**Durante la preparación y utilización del producto:  
NO FUMAR - COMER O BEBER**

**EVITAR** la inhalación de la sustancia nebulizada y el contacto del producto con la boca, la piel y los ojos. **USAR** traje protector adecuado, gafas, mascarilla, guantes y botas. En caso de contaminación lavarse las manos y partes expuestas de la piel.

Antes de **COMER, BEBER O FUMAR**, sacarse la ropa contaminada, y lavarse bien las partes expuestas de la piel con abundante agua.

### FRASES DE ADVERTENCIA

Peligroso para animales domésticos, la fauna y flora silvestre. No emplear este empaque para ningún otro fin. Antes de destruir el empaque enjuagarlo con agua (cuarta parte del contenido) por lo menos tres veces y los residuos viértalos en el equipo de aspersión. En caso de derrame, recoger el producto y transferir a recipientes revestidos interiormente con doble bolsa de polietileno, herméticamente cerrados y rotulados para su disposición final. Mantener limpio y en buenas condiciones el equipo utilizado en las aplicaciones cuidando que no se produzcan escapes ni contaminación externa.



### INSTRUCCIONES PARA PRIMEROS AUXILIOS Y CONSEJOS PARA LOS MÉDICOS

**INHALACIÓN:** Apartar al accidentado de la zona de peligro y suministre aire fresco.

**CONTACTO CON LOS OJOS:** Lavar inmediatamente con abundante agua, por lo menos 15 minutos y acudir al médico.

**INGESTIÓN:** Dar a beber dos vasos de agua. No dar nada por la boca si la persona está inconsciente.

**CONSULTAR CON UN MÉDICO Y MOSTRARLE LA ETIQUETA.**

### LOS SÍNTOMAS.

Pueden consistir en irritación de los ojos por contacto con el polvo. En animales de laboratorio por ingestión se ha encontrado, salivación y diarreas.

### DIAGNÓSTICO.

**Rally™ 40 PM** tiene toxicidad mínima después de una exposición oral aguda. Hay aumento de la actividad hepática de la oxidasa de función mixta (OFM).

### TRATAMIENTO.

No hay antídoto específico para **Rally™ 40 PM**. Es conveniente el lavado gástrico.

Para mayor información diríjase a **Interroc S.A.**  
Km 16.5 Vía Daule Telf. 593 4 288-1662.  
Guayaquil, Ecuador.

