

## Bronquidiazina C.R. Suspensión

### COMPOSICIÓN

	Por 7,5 ml	Por 2,5 ml
Trimetoprim	80 mg	26,7 mg
Sulfametoxazol	400 mg	133,3 mg
Bromexina HCl	4 mg	1,3 mg
Benzoato de sodio	250 mg	83,3 mg
Extracto fluido de bálsamo tolú	325 mg	108,3 mg

Excipientes: Glicerol (E422), sacarosa, goma xantana, sacarina de sodio, parahidroxibenzoato de metilo (E218), polisorbato 80, parahidroxibenzoato de propilo (E216), dimeticona, esencia de anís, agua, c.s.

### PROPIEDADES

La asociación de una sulfamida, el sulfametoxazol y una diaminopirimidina, la trimetoprima, da lugar a un medicamento eficaz frente a una gran variedad de gérmenes causantes de diferentes enfermedades.

Bronquidiazina C.R. logra también, a través de la Bromexina, un efecto fluidificante de las secreciones respiratorias, efecto conseguido gracias a la obtención de una disminución de la viscosidad del mucus. El resultado final es una mayor facilidad de expulsión de dichas secreciones.

Finalmente, gracias al Benzoato de sodio y al Jarabe bálsamo Tolú, Bronquidiazina C.R. posee una clara actividad balsámico-expectorante.

### INDICACIONES

#### **Infecciones del aparato respiratorio:**

Bronquitis aguda y reagudización de la bronquitis crónica, neumonía, infecciones del oído medio y sinusitis.

Tratamiento y prevención de neumonía por *Pneumocystis Carinii*.

Cualquiera de las infecciones citadas debe ser diagnosticada y su tratamiento establecido por el médico, por lo que no debe, en ningún caso, utilizarse este medicamento por propia iniciativa.

### POSOLOGÍA. MODO DE EMPLEO

Las dosis prescritas por el médico no deben modificarse ni interrumpirse.

Como regla general puede darse la siguiente pauta para la utilización del medicamento.

En el **adulto**, la dosis media es de 7,5 ml tres veces al día.

En el **niño**, la dosis habitual es de 2,5 ml igualmente tres veces al día.

### ADVERTENCIAS

#### **Advertencia sobre excipientes**

Este medicamento por contener glicerol como excipiente puede ser perjudicial a dosis elevadas. Puede provocar dolor de cabeza, molestias de estómago y diarrea.

### CONTRAINDICACIONES

- Este medicamento puede resultar contraindicado en personas sensibles a alguna de las sustancias que lo componen.
- No debe utilizarse en niños prematuros o menores de dos meses.
- No debe utilizarse sin una supervisión adecuada en desórdenes hematológicos graves.

### PRECAUCIONES

- Debe ser empleado con precaución en pacientes con insuficiencia renal o hepática, o en los afectados por desnutrición o alcoholismo.

- Se empleará con precaución en pacientes con alergias graves o asma bronquial.
- Se debe poner especial cuidado en tratar con este medicamento a pacientes ancianos.
- Evitar la exposición excesiva al sol o el uso de lámparas solares.

#### **Embarazo y lactancia**

La posible utilización de este medicamento en los períodos de embarazo y lactancia será igualmente valorada y establecida por el médico.

#### **EFECTOS SECUNDARIOS**

Este medicamento es, generalmente, bien tolerado por la mayoría de los pacientes.

No obstante en determinados casos, pueden producirse náuseas, vómitos, diarrea o dificultades respiratorias.

Más raramente rojeces en la piel y en pacientes de edad avanzada erupciones cutáneas de mayor gravedad.

Si aparece cualquiera de los síntomas citados se deberá consultar inmediatamente al médico.

#### **INCOMPATIBILIDADES**

Este medicamento puede tener una influencia sobre la acción de otros que se estén tomando simultáneamente por lo que si está usted en tratamiento para diabetes, epilepsia o con fármacos con efecto sobre la coagulación de la sangre, deberá comunicarlo a su médico.

#### **INTOXICACIÓN Y SU TRATAMIENTO**

La toma accidental de este medicamento o la sobredosificación deben ser inmediatamente comunicados al médico, indicando la cantidad de producto ingerido.

Los síntomas de sobredosificación más frecuentes son vómitos, náuseas, vértigo y confusión.

En cualquier caso:

En caso de sobredosis o ingestión accidental, consultar al Servicio de Información Toxicológica. Teléfono 91 562 04 20.

#### **PRESENTACIÓN**

Frasco conteniendo 150 ml y medida dosificadora.

#### **AGÍTESE ANTES DE USARLO**

**Con receta médica.**

**Los medicamentos deben mantenerse fuera del alcance de los niños.**

---

**FAES FARMA, S.A.**

Máximo Aguirre, 14 - Lamiaco (Lejona) - Vizcaya