

FICHA TÉCNICA**TOPGUN****TIPO DE FORMULACIÓN:** suspoemulsión (SE)**USO:** FUNGICIDA**INGREDIENTE ACTIVO:**

AZOSITROBIN 125 g/L + TRIDEMORPH 215 g/L

Nombre IUPAC: Azoxistrobin

methyl (E)-2-{2-[6-(2-cyanophenoxy)pyrimidin-4-yloxy]phenyl}-3-methoxyacrylate (IUPAC)

Tridemorph: 4-alkyl-2,6-dimethylmorpholine; for original definition, 2,6-dimethyl-4-tridecylmorpholine (IUPAC)

EMPRESA FORMULADORA: INTEROC S.A.Dirección: Km 16½ vía Daule
Guayaquil – Ecuador**TITULAR DEL REGISTRO:****INTEROC S.A. SUCURSAL COLOMBIA****INTEROC @ CUSTER**Autopista Medellín Km 3.4
Centro Empresarial Metropolitano Modulo 3, Bodega 13
Cota – Colombia
Telf: 8415771 - 8415055**REGISTRO NACIONAL ICA No. 870****MODO DE ACCIÓN:**

TOPGUN®, es un fungicida sistémico, protectante, de acción curativa, erradicante y translaminar. Es absorbido por las hojas y raíces. Inhibe la germinación de la espora, el crecimiento del micelio, la respiración mitocondrial por bloqueo de la transferencia de electrones entre el citocromo b y el citocromo c1 al oxidar el sitio ubiquinol, la biosíntesis del ergosterol, por inhibición de la reducción del esterol (esterol- Δ^14 -reductasa) e isomerización (Δ^8 a Δ^7 -isomerasa).

Controla la cepa de patógenos resistentes al inhibidor demethylase 14, fenilamidas, dicarboxamidas o benzimidazoles. Muestra actividad antiesporulante.

USO AGRÍCOLA

DOSIS Y MODO DE EMPLEO

CULTIVO	PLAGA	DOSIS	P.C	P.R
Rosa (<i>Rosa sp.</i>)	Mildeo polvoso (<i>Sphaeroteca pannosa</i>)	1.0 cc/L a la aparición de los primeros síntomas 1.2 cc/l en presencia de la enfermedad.	N.A.	12 horas
Arroz (Oriza sativa)	Añublo de la vaina (<i>Rhizoctonia solani</i>)	0.6 L/ha	7 días	12 horas

P.C: Período de carencia

P.R: Período de reentrada

MODO DE EMPLEO:

TOPGUN® se aplica con la aparición de los primeros síntomas o presencia de la enfermedad. Calcule la cantidad de agua a emplear acorde a la superficie que pretende proteger. Colocar la mitad del agua en el tanque de mezcla, adicione la cantidad recomendada de **TOPGUN®** y agite. Adicione el resto del agua.

COMPATIBILIDAD:

Se recomienda hacer pruebas preliminares a pequeña escala bajo la responsabilidad del usuario para demostrar que la mezcla sea físicamente compatible, eficaz y no fitotóxica bajo las condiciones locales de uso. Si se usa a las dosis recomendadas es poco probable que se presente problemas de fitotoxicidad.

TOPGUN® es incompatible con productos de reacción alcalina.

PRESENTACIONES A COMERCIALIZARSE EN COLOMBIA:

1 litro,

CATEGORÍA TOXICOLÓGICA: II MODERADAMENTE PELIGROSO

EMERGENCIAS TOXICOLÓGICAS 24 HORAS CISPROQUIM 018000916012 Fuera de Bogotá. En Bogotá comunicarse con el Teléfono (1) 2886012.

AVISO AL AGRICULTOR: el fabricante garantiza la composición y calidad del producto, no se responsabiliza por el uso imprudente, excesivo o indebido por parte del agricultor.