

BEXIDERMIL crema

Salicilato de trietanolamina

Composición:

Cada gramo contiene:

Salicilato de trietanolamina..... 100 mg

Excipientes: Ácido sórbico, propilenglicol, trietanolamina, alcohol estearílico, alcohol cetílico, sorbitan monoestearato, polisorbato 60, polisorbato 80, miristato de isopropilo, butilhidroxianisol, edetato sódico, alcanfor, mentol y agua desionizada.

Propiedades

Analgésico antiinflamatorio externo que penetra y se absorbe rápidamente, produciendo un alivio inmediato del dolor.

Indicaciones

Dolor, inflamación y edema post-traumático en golpes, contusiones, esguinces. Inflamación de los ligamentos, de las articulaciones, inflamación de los tendones. Dolores reumatoideos, musculares y como complementario de las enfermedades reumáticas articulares.

Posología y modo de empleo

Aplíquese sobre la zona afecta 2 ó 3 veces al día, siendo aconsejable una aplicación adicional a la hora de acostarse. Debe realizarse un suave masaje hasta que se absorba.

Contraindicaciones

Antecedentes de hipersensibilidad a salicilatos.

No utilizar sobre piel lesionada y mucosas.

No utilizar en niños menores de 10 años.

Precauciones

Sólo para uso externo. Si el producto se usa de forma intensa y continuada, puede producirse una ligera descamación de la piel (peeling), reacción normal de la misma al uso de salicilatos que no impide continuar el tratamiento.

Deberá utilizarse en aplicaciones locales, no en grandes zonas.

No utilizar durante el embarazo y lactancia sin consultar al médico.

Si aparece enrojecimiento, agravamiento de los síntomas o si el dolor persiste durante más de 7 días, interrumpir el tratamiento y consultar al médico.

Evitar el contacto con los ojos.

Advertencias sobre excipientes

Por contener ácido sórbico como excipiente, en uso tópico puede causar dermatitis.

Por contener butilhidroxianisol como excipiente puede ser irritante de ojos, piel y mucosas.

Interacciones

No se han descrito.

Efectos secundarios

Erupciones en el lugar de aplicación como reacción de hipersensibilidad.

Intoxicación y su tratamiento

En la práctica es muy improbable que en la administración por vía tópica se produzcan intoxicaciones. En caso de ingestión por vía oral, deberá darse aviso a un facultativo para que proceda a provocar el vómito y/o lavado gástrico si lo juzga necesario o bien consultar al Servicio de Información Toxicológica.
Teléfono 91 562 04 20.

Presentación

Bexidermil® Crema. Tubo de 50 g

Otras presentaciones

Bexidermil® Aerosol. Frasco de 200 ml

Bexidermil® Gel. Tubo de 50 g

Sin receta médica**Mantener fuera del alcance de los niños**

Fabricado por:
Laboratorios Sr. ESTEVE, S.A.
Martorelles (Barcelona)

Isdin SA
Provençals 33
08019 Barcelona
España