

nopucid[®]

COMPUESTO

Deltametrina
Piperonil Butóxido

Aerosol

Venta Libre - Industria Argentina

Fórmula:

Cada envase de 130 ml/82 g contiene: deltametrina 0,026 g; butóxido de piperonilo 0,130 g.
Excipientes: B.H.T.; isopar G; silicona AK-35; alcohol isopropílico; prop. butano c.s.p. 130 ml.

Indicaciones:

Ectoparasitocida de uso externo para el tratamiento de la pediculosis del cuero cabelludo.

Acción terapéutica:

Pediculicida. Actúa sobre los piojos y las liendres más expuestas.


Modo de empleo:

Se recomienda el siguiente esquema:




- Agite el envase antes de usarlo.

1




- Rocíar **Nopucid Compuesto aerosol** a corta distancia (2 cm) de la zona a tratar; mediante toques breves (1 seg.) de la válvula. Impregnar el cuero cabelludo y el cabello hasta las puntas.
Aplicar el producto una sola vez al día.

2



- Dejar actuar el producto durante 30 minutos solamente.

3



- Lavar el cabello con su shampoo habitual y luego enjuagarlo (puede emplear una crema enjuague).

4



- Con el cabello aún húmedo, pasar un peine extrafino para facilitar el arrastre de los huevos o liendres. El peinado debe efectuarse desde la raíz a la punta del cabello.

5

En los días subsiguientes se aconseja examinar minuciosamente la cabeza del paciente infestado. Una sola aplicación suele ser efectiva, sin embargo, en caso de detectar la presencia de piojos vivos y/o liendres, repetir el tratamiento a los 7 ó 14 días de la primera aplicación.

Medidas complementarias

Los piojos o sus huevos no sólo están en la cabeza, sino que también los podemos hallar por períodos cortos (2 a 3 días) en diversos lugares de alto riesgo epidémico (escuelas, clubes, piletas de natación, areneros, colonias de vacaciones, etc.) e incluso en objetos de uso personal y ropas que están en contacto con el infestado.

Sugerimos, además, el empleo de **Nopucid Compuesto aerosol** sobre objetos inanimados (sin vida), rociando los mismos mediante toques breves (1 seg.) de la válvula y a corta distancia (10 cm).

Efectos secundarios:

En individuos sensibles puede observarse irritación, prurito (picazón), ardor, eritema (enrojecimiento de la piel) a nivel de cuero cabelludo. Raramente se han descrito casos de rinorrea (aumento de la secreción nasal), tos, irritación de la garganta y broncoespasmo cuando se inhala el producto. Dificultad respiratoria o crisis asmática en personas predispuestas.

Contraindicaciones:

Hipersensibilidad a cualquier componente de la fórmula. Embarazo. Lactancia. Menores de 2 años.

Precauciones y advertencias:

- **Nopucid Compuesto aerosol** es de uso tópico externo (en la cabeza) exclusivo.
- **Evitar el contacto con los ojos, mucosas (labios), heridas y quemaduras.** En caso de producirse el contacto accidental del producto con los ojos, mucosas, heridas o quemaduras, lavar con abundante agua fría. Consultar al médico si persiste la irritación.
- Si hubiere infección o lesiones a nivel del cuero cabelludo, consultar al médico antes de utilizar el producto. Debe tenerse en cuenta que en la pediculosis son frecuentes las lesiones por rascado.
- **No debe inhalarse.**
- **No debe ingerirse.** En caso de ingestión accidental del producto, consultar al médico, hospital o centros de toxicología más cercano:
Hospital A. Posadas (011) 4654-6648/4658-7777.
Hospital de Pediatría Ricardo Gutiérrez (011) 4962-6666/2247.
Centro Nacional de Intoxicaciones 0800-3330160
- **Inflamable. No exponer a temperatura superior a 50 °C.**
- **No perforar el envase.**
- **No vaporizar cerca del fuego, ni arrojar al incinerador.**
- Recordar que es conveniente utilizar este producto en lugares bien ventilados.

Información para el paciente:

Las liendres (huevos) suelen ser más visibles cerca del cuello y detrás de las orejas, pero pueden encontrarse en cualquier parte de la cabeza. Todas las prendas en contacto con el paciente deben ser bien lavadas con agua bien caliente ó en lavarropas durante 20 minutos. Las que no puedan ser lavadas, dejar en bolsa plástica cerrada por 2 semanas.

Desinfectar peines y cepillos con agua hirviendo durante, por lo menos, 5 minutos debido a que ninguna piretrina es totalmente ovidada (no actúa sobre todas las liendres sino sobre las más expuestas) y a pesar de la actividad residual de las mismas es necesario remover las liendres mecánicamente con un peine fino y en ocasiones repetir el tratamiento a los 7 ó 14 días del primero. Evaluar al grupo de convivencia del paciente, ya que el tratamiento es más efectivo simultáneamente en todas las personas infestadas.

Presentaciones	Contenido
Nopucid Compuesto aerosol	130 ml
Nopucid Compuesto <i>shampoo</i>	100 ml
Nopucid Compuesto <i>loción</i>	100 ml
Nopucid 10 <i>crema acondicionadora</i>	100 g
Nopucid mc <i>loción</i>	100 ml

Conservar por debajo de los 40 °C (preferentemente entre 15 y 30 °C), en envase perfectamente cerrado. Proteger del congelamiento. Mantener éste y todos los medicamentos fuera del alcance de los niños. Ante la menor duda consulte a su médico y/o farmacéutico.

Esp. Med. aut. por el Ministerio de Salud - Certificado N° 38.691
INTERBELLE COSMETICS S.A. - Sanabria 2353, CABA.
Elaborado en: Calle N° 3 esquina calle N° 103. Localidad
Parque Industrial Norte, Pcia. de San Luis.
Dir.Téc.: Diego L. Iacovone, Farmacéutico.