


PENDIMETALINA 400 CE

®



Grupo

Herbicida

PENDIMETALINA 400 CE.- Es un herbicida pre emergente del grupo de las dinitro anilinas , formulado como Concentrado Emulsionable que contiene 400 gr/ L de ingrediente activo por litro de producto comercial. Tiene alta selectividad a los cultivos de maíz, sorgo, soya, arroz, tabaco, algodón, frejol, tomate, cebolla, ajo y girasol, a los que ofrece un control eficaz de una amplia gama de malezas ejerciendo su actividad mediante la inhibición del desarrollo de la mismas, las cuales mueren poco después de haber germinado o luego de haber emergido del suelo, no deja residuos que puedan dañar los cultivos subsiguientes. Este herbicida inhibe tanto la división como la elongación celular en meristemos de tallo y la raíz de las malezas susceptibles.

Composición.

Formulación: Concentrado Emulsionable (CE)

Olor:

Solubilidad: Totalmente soluble en agua

Composición garantizada:

Pendimentalín	400 g / L
---------------	-----------

Modo de acción

PENDIMETALINA 400 CE.- Actúa como herbicida sistémico y selectivo al cultivo de arroz, es un inhibidor de la división celular y también inhibidor de la síntesis de ácidos grasos de cadenas largas. Es muy eficaz en tipos de suelo arenosos y arcillosos. El producto se descompone durante el ciclo del cultivo, no existiendo riesgos con otros cultivos en rotación

Aplicación

PENDIMETALINA 400 CE.- Se puede aplicar en cultivos de arroz, en pre emergencia o pre siembra.

Modo de empleo. Dosis.

Llenar hasta la mitad el tanque de pulverización, agregar el producto y terminar el llenado, siempre con el sistema de agitación en funcionamiento.

CULTIVO	MALEZAS N. COMÚN	DÓSIFICACIÓN SEGÚN TIPO DE SUELO (L/HA)			ÉPOCA Y FRECUENCIA DE APLICACIÓN
		LIVIANO	MEDIO	PESADO	
ALGODÓN	Caminadora	2.5	3.0	3.5	Aplíquese en presembrado a una profundidad de 6 a 8 cm, después de la siembra (max. 24 horas después)
MAÍZ	Paja de burro	2.5	3.0	4.0	Aplíquese en pre-emergente y post-emergente en mezcla solo con atrazina cuando las malezas tengan menos de 2 hojas.
ARROZ	Falsa caminadora	2.5	3.0	4.0	Pre-emergente Aplique inmediatamente después de la siembra Post emergente Aplique en mezcla con propanil 360 CE
SOYA	Paja de pato	2.5	3.0	4.0	Aplicar antes de la siembra a una profundidad de 6 a 8 cm mediante pase cruzado de rastra de disco doble o bien otro implemento que mezcle bien el herbicida con el suelo.
FREJOL	Barba de indio	2.5	3.0	3.5	
TABACO	Guardarocio	2.5	3.0	3.5	Aplique en transplante incorporado. De 0.80 a 1.25 litros de Pendined por c/100 L de agua. Aplicando 20 cc por cada planta.
TOMATE	Pasto de dulce	2.5	3.0	3.5	Aplique en transplante incorporado
CEBOLLA	Cola de zorro	2.5	3.0	4.0	Aplique después de dos o tres días del transplante
AJO	Pasto jhonson	2.5	3.0	4.0	Aplique pre-emergente después de la siembra
GIRASOL	Pasto ghinea	2.5	3.0	4.0	Aplique pre-sembrado incorporado o pre-emergente después de la siembra se recomienda adición de 1 K de Prometina/Ha para ampliar el espectro de control de malezas de hoja ancha.
	Bledo	2.5	3.0	3.5	
	Cadello abrojo	2.5	3.0	3.5	

Compatibilidad

PENDIMETALINA 400 CE.- es compatible con la mayoría de los pesticidas de uso común en la agricultura moderna, se recomienda efectuar pruebas de compatibilidad en pequeñas escalas. Para óptimos resultados se recomienda aplicar con agua ligeramente ácida, con un rango de Ph de 4,5-5,5; recomendamos aplicar pH Ned.

Fitotoxicidad

Categoría toxicológica III
 Franja Azul, Ligeramente Tóxico.

Presentación

Envases plásticos de 1 Litro, 1 Galón, 2.5 Galones, 5 Galones, 200 Litros.

Almacenaje y manipulación

Guárdese en un sitio limpio, fresco y seco, fuera de la luz directa. Se evitarán oscilaciones extremas de temperatura durante su almacenaje. Agítese antes de usar.

Observaciones

Para más detalles sobre **PENDIMETALINA 400 CE** visite nuestro sitio web: www.nederagro.com o contáctese con nuestro servicio al cliente PBX: 042 114422 email: ventas@nederagro.com
 Guayaquil - Ecuador.