



Insecticida piretroide que incorpora la tecnología ZEON, se trata de una formulación en micro-esferas exclusivas con alta potencia insecticida. Actúa por contacto e ingestión, con un gran efecto de choque y también de repelencia.

APLICACIONES AUTORIZADAS

Solanáceas: mosca blanca, chinche verde, orugas, pulgones y ortópteros • **Cucurbitáceas, brécol y coliflor:** mosca blanca, orugas, pulgones y ortópteros • **Apio:** mosca, orugas, pulgones y ortópteros • **Lechuga, fresales, apionabo, rábano, coles de Bruselas, repollo, almendro, naranja, pomelo, toronja, colza, hierbas aromáticas:** orugas, pulgones y ortópteros • **Cítricos:** ceratitis y ortópteros • **Avellano, hortalizas de bulbo, espinaca y similar, guisantes verdes, judías verdes, leguminosas grano, grosellero y lúpulo:** pulgones y ortópteros • **Frutales de pepita:** carpocapsa, ceratitis, orugas minadoras, pulgones y ortópteros • **Frutales de hueso:** anarsia, carpocapsa, ceratitis, orugas minadoras, pulgones y ortópteros • **Olivo:** Prays (generaciones antófaga y filófaga) y ortópteros • **Cerezo:** orugas defoliadoras, mosca de la cereza, anarsia, carpocapsa, ceratitis, orugas minadoras, pulgones y ortópteros • **Maíz:** Heliothis, pulgones y ortópteros • **Algodonero:** Earias, Heliothis, orugas, pulgones y ortópteros • **Patata:** escarabajo, orugas, pulgones y ortópteros • **Remolacha:** Cássida, pulgones, pulguilla y ortópteros • **Cereales:** garrapático, sanpedito, pulgones y ortópteros • **Eriales:** Ortópteros • **Alfalfa:** Apion, cuca, gusano verde, pulgones y ortópteros • **Vid:** polillas del racimo, ortópteros, pulgones, altica y *Scaphoideus tittanus* • **Ornamentales herbáceas:** Heliothis, orugas, pulgones, Tortrix y ortópteros.

DOSIS Y MODO DE EMPLEO

En general aplicar en pulverización normal.

Naranja, pomelo, toronja, almendro, avellano, frutales de pepita (carpocapsa, orugas minadoras, pulgones y ortópteros), frutales de hueso (anarsia, carpocapsa, orugas minadoras, pulgones y ortópteros), cerezo (orugas defoliadoras), fresales, grosellero, patata, apionabo, rábano, solanáceas, cucurbitáceas, hortalizas de bulbo, brécol, coliflor, coles de Bruselas, repollo, apio, lechuga, espinaca y similar, guisantes verdes, judías verdes, leguminosas grano, colza, alfalfa, algodón, cereales, maíz, lúpulo, eriales, vid (polillas del racimo y pulgones), hierbas aromáticas y

Composición	Lambda cihalotrin 10 % p/v (100 g/l)
Formulación	Suspensión de Cápsulas (CS)
R.O.P.M.F. n°	22.398
Envasado	1 Litro, 5 Litros
Clasificación	Nocivo (Xn) Peligroso para el Medio Ambiente (N) Peligroso para las abejas

ornamentales herbáceas empleando 10 – 20 cc/hl.

Remolacha: aplicar a dosis de 10 – 15 cc/hl.

Vid: *Scaphoideus tittanus*, dosificar a razón de 25 cc/hl.

Altica, dosificar a razón de 20-25 cc/hl hasta el envero.

Cítricos, cerezo: Ceratitis y mosca de la cereza, aplicar a dosis de 100 – 125 cc/hl, sólo en pulverización cebo, mezclado con proteínas hidrolizadas a 600 cc/hl y aplicado a razón de 100 cc/árbol, tratando una superficie de 1-2 m², preferentemente en su lado sur.

Frutales de hueso y pepita (ceratitis): aplicar en pulverización foliar a dosis de 10-20 cc/hl o en pulverización cebo a dosis de 100 – 125 cc/hl en mezcla con proteínas hidrolizadas a 600 cc/hl tratando una superficie de 1-2 m² por árbol, preferentemente en su lado sur.

Olivo: Dosificar a razón de 10-20 cc/hl. La aplicación se realizará en el período comprendido entre la recolección de la cosecha y la floración de la siguiente.

PLAZO DE SEGURIDAD

Frutales de hueso (excepto cerezo): 1 día • Frutales de pepita, apio, apionabo, brécol, cucurbitáceas, espinaca y similar, fresales, rábano, repollo y solanáceas: 3 días • Alfalfa, almendro, avellano, cítricos, coles de Bruselas, coliflor, eriales, cerezo, guisantes verdes, judías verdes, hierbas aromáticas, hortalizas de bulbo, lechugas, lúpulo, naranja, pomelo, toronja y vid (excepto para *Scaphoideus tittanus*): 7 días • Grosellero: 14 días • Patata: 15 días • Algodonero, cereales, colza, leguminosas de grano y maíz: 30 días • Remolacha: 45 días • Olivo, ornamentales herbáceas y vid (*Scaphoideus tittanus*): No procede