

# NICLOSOL LPU

**Niclosamida 18%+ Levamisol 1.5% + Cobalto**

## DESCRIPCIÓN:

**NICLOSOL LPU** es un antihelmíntico en suspensión oral, lista para usar, con propiedad tenicida, nematocida e inmunoestimulante. Contiene una combinación estable de Niclosamida, Levamisol y Cobalto.

## COMPOSICIÓN: por cada 100 mL

Niclosamida.....	18.00 g
Levamisol.....	1.50 g
Sulfato de cobalto.....	100.00 mg
Excipientes c.s.p.....	100.00 mL

## INDICACIONES DE USO:

### Indicado en Bovinos, Ovinos, Camélidos Sudamericanos, Caprinos:

Nematodos gastrointestinales, estado adulto y larvario: *Haemonchus* spp., *Ostertagia* spp., *Trichostrongylus* spp., *Cooperia* spp, *Nematodirus* spp., *Oesophagostomum* spp. *Chabertia* spp, *Dictyocaulus* spp., *Bunostomum* spp., *Parafilaria bovicola* (filariasis subcutánea), *Thelazia* spp., *Trichuris* spp., ascariasis.

Tenicida: para control de tenias del género *Moniezia*. Eficaz para el control de *Thysanosoma actinioides* en ovinos.

### Indicado en caninos:

Ascariasis, *Ancylostoma* spp., *Dirofilaria* spp., *Dipylidium caninum*, *Echinococcus granulosus*

## EFFECTOS COLATERALES, INCOMPATIBILIDAD Y ANTAGONISMO FARMACOLÓGICO:

- No se recomienda usar simultáneamente con fenilbutazona y análogos y/o corticoides.
- No se aconseja su uso con drogas inmunosupresoras y/o potencialmente capaces de producir depresión de la médula ósea.
- No utilizar junto con antihelmínticos a base de sulfato de nicotina ya que este compuesto aumenta la toxicidad del levamisol.
- **No usar en equinos.**
- Mantener alejado del alcance de los niños

## BENEFICIOS:

- Antiparasitario de amplio espectro contra parásitos internos, lista para usar.
- Contiene Niclosamida, Levamisol y Cobalto.
- Posee triple acción: tenicida, nematocida e inmunoestimulante.

## MODO DE EMPLEO:

Antiparasitario oral, indicado para el ganado bovino, ovino, caprino, camélidos sudamericanos y caninos.

**La dosis para bovinos, ovinos, caprinos, camélidos sudamericanos y caninos** es de 0.5 mL por cada 1 Kg de peso vivo del animal, equivalente a 90 mg de Niclosamida y 7.5 mg de Levamisol por Kg de peso vivo del animal.

## PERIODO DE RETIRO:

- No sacrificar animales antes de los 30 días del último tratamiento.
- No administrar en animales en producción láctea destinada para consumo humano.

## PRECAUCIONES:

- **Agitar vigorosamente el producto antes de usarlo.**
- Mantener alejado del alcance de los niños.
- Consérvese a una temperatura de 15°C a 30°C.

- Consérvese protegido del sol.
- Consérvese en su frasco herméticamente cerrado.
- Consérvese alejado de alimentos y medicinas.

**PRESENTACION:**

Frascos de 30mL, 75mL, 100mL, 200mL, 250mL, 500mL, 1L  
Galonera de 3,5 litros.

**Reg. SENASA: F.08.02.N.0774**