AMINOCAT

Aminoácidos para la aplicación Foliar

ADVERTENCIA: La información contenida en este documento es solo de carácter referencial.

Aminocat, Se obtiene mediante hidrólisis de proteínas de origen vegetal de efecto inmediato. Aumenta la resistencia de las plantas a las condiciones adversas como excesos de frío y calor, problemas de fototoxicidad, plagas o enfermedades. Desempeña un papel fundamental en la físiologia de la planta e interviene en la formación de proteínas.

COMPOSICION:

METALES PESADOS

Riquezas Garantizadas:

Aminoacidos Libres	10 % p/p
Nitrogeno Total (N)	3% p/p
Nitrogeno Organico (N)	1,7% p/p
Nitrogeno Amoniacal (N)	0,6% p/p
Nitrogeno Ntrico (N)	0,7% p/p
Fosforo Total (P_2O_5)	1% p/p
Potasio Total (K_2O)	1% p/p

Metales pesados:

Arsenico (As)	< 0,1 ppm
Cadmio (Cd)	0,05 ppm
Cromo (Cr)	0,9 ppm
Plomo (Pb)	0,1 ppm
Mercurio (Hg)	< 0,2 ppm
Níquel (Ni)	1 ppm
Zinc (Zn)	32 ppm

<< FERTILIZANTE FOLIAR LIQUIDO, LEA LA ETIQUETA COMPLETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO>>

Lote Nº:
Contenido Neto: 1 Litro
Fecha Vencimiento:

Importado y distribuido por:

Anasac Chile S.A
Almirante Pastene 300 – Providencia
SANTIAGO – CHILE
Tel.: 00 56 2 470 68 50-00 56 2 470 60 00
Fax.: 00 40 21 410 0889

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS

Mantener fuera del alcance de los niños.
Evitar el contacto con ojos y piel.
Es nocivo por ingestión.
No ingerirlo
Lavar con agua y jabón después de su apliación.

MODO DE EMPLEO

Se debe utilizar por vía foliar a las dosis recomendadas durante el ciclo vegetatito en cultivos horticolas, citrícos, platanera y frutales, excepto el ciruelo. También se puede utilizar mezclando con el agua de riego en todos los cultivos. Está especialmente indicado para cultivos hidropónicos.

COMPATIBLIDADES

Puede mezclarse con la mayoría de insecticidas fungicidas y abonos foliares. No mezclar con cobre ni azufre ni sus derivados. No mezclar con aceites minerales, ni con productos de reacción muy alcalina.

<< MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y PERSONAS INEXPERTAS >>
<< NO LAVAR LOS ENVASES O EQUIPOS DE APLICACIÓN EN LAGOS, RIOS Y OTRAS FUENTES DE AGUA >>
<< LOS ENVASES INUTILIZARLOS Y ELIMINARLOS DE ACUERDO CON INSTRUCCIONES DE LAS AUTORIDADES COMPETENTES >>
<<LA ELIMINACION DE RESIDUOS DEBERA EFECTUARSE DE ACUERDO CON INSTRUCCIONES DE LA AUTORIDAD COMPETENTE>>

<< EN CASO DE INTOXICACION MOSTRAR LA ETIQUETA, FOLLETO O EL ENVASE A PERSONAL DE SALUD>>

Teléfonos de emergencia:
(2) 7771994 – (2) 6619414 (CORPORACION RITA); (2)4869000 (ANASAC)

<< NO TRANSPORTAR NI ALMACENAR CON ALIMENTOS, PRODUCTOS VEGETALES O CUALESQUIERA OTROS QUE ESTEN DESTINADOS AL USO O CONSUMO HUMANO O ANIMAL>>

DOSIS

Cultivo	Dosis Foliar (cc/100 Litros)
Frutales: manzanos, perales, kiwies, cerezos, duraznos, damascos, nectarines, paltos, cítricos, almendros, nogales, olivos, chirimoyos, papayos, una de mesa, uva vnífera, pepino dulce.	200 - 300
Berries: frutillas, frambuesas, arándanos, zarzapatilla, moras, grosellas, murtas.	200 - 300
Hortalizas: Lechugas, pimentones, tomates, radicchio, coliflor, brócoli, espinaza, acelga, arvejas, habas, maíz, alcachofas, apio, pepinos, zapallitos italianos, zapallo camote.	200 - 300
Almácigos e Hidroponia	200 - 300
Cultivos (Trigo, Maíz, Arroz)	200 - 300 1 L/Ha en Mezcla con herbicida Selectivo
Ornamentales: Claveles, Rosas, Crisantemos, Gérberas, Lillium, Gladiolos, Tulipanes, Alstroemerías, Girasoles, Margaritas, Gipsophilas.	200 - 300