

CERDOVIRAC CEPA CHINA



Vacuna contra la peste porcina clásica



COMPOSICIÓN:

Cada dosis (2 ml) contiene un mínimo de 10^3 D.I.₅₀ de virus vivo cepa China lapinizada.

INDICACIONES: Inmunización de los porcinos jóvenes y adultos contra la peste porcina clásica (hog cholera) o cólera porcino.

DOSIS Y MODO DE EMPLEO: 2 ml. Vacunar a los lechones a las 3 semanas de edad si son hijos de madres no vacunadas, o a las 6 semanas si son hijos de madres vacunadas.

Revacunar anualmente.

VÍA DE ADMINISTRACIÓN: Intramuscular en la parte media de la pierna o jamón teniendo cuidado de no inyectar cerca de las articulaciones.

PRECAUCIONES:

- Mantener fuera del alcance de los niños.
- Conservar en refrigeración entre 3 y 7° C.
- No vacunar animales enfermos, desnutridos o en estado febril.

PRESENTACIONES:

Frascos x 5 dosis con su respectivo diluyente.

Frascos x 10 dosis con su respectivo diluyente.

REGISTRO: 4A-3061-AGROCALIDAD

ELABORADO Y DISTRIBUIDO POR: LABORATORIOS LIFE ECUADOR.