



# SYNALAR<sup>®</sup> Neomicina

Crema

## PROPIEDADES

SYNALAR Neomicina debe su efectividad terapéutica a la actividad antiinflamatoria, antipruriginosa y vasoconstrictora de la Fluocinolona y a la actividad antibiótica de la Neomicina..

## COMPOSICIÓN

Cada gramo contiene: Acetónido de Fluocinolona, (D.C.I.), 0,00025 g; Neomicina (D.C.I.) (en forma de sulfato), 0,0035 g. Excipientes: alcohol cetílico, alcohol estearílico, estearato de sorbitano, polisorbato 60, parafina líquida, parahidroxibenzoato de metilo, parahidroxibenzoato de propilo, propilenglicol, ácido cítrico anhidro, agua c.s.

## INDICACIONES

SYNALAR Neomicina está indicado en el tratamiento de dermatitis inflamatorias, pruriginosas y alérgicas susceptibles de sobreinfección por microorganismos sensibles a la Neomicina.

## POSOLOGÍA Y MODO DE EMPLEO

Aplicar una fina capa de crema sobre la zona afectada 2-3 veces al día, frotando suavemente hasta su total desaparición.

## CONTRAINDICACIONES

SYNALAR Neomicina está contraindicado en pacientes con una historia de hipersensibilidad a algunos de sus componentes.

Lesiones víricas de la piel: Viruela, Varicela, Herpes Zóster.

Lesiones tuberculosas de la piel y luéticas.

Este preparado no debe aplicarse en el conducto auditivo externo de pacientes con perforación timpánica.

## PRECAUCIONES

El uso prolongado de corticoides tópicos puede producir atrofia de la piel y del tejido subcutáneo. Cuando se aplican en la cara, esto puede ocurrir incluso en tratamientos de corta duración.

La aplicación de corticoides sobre grandes superficies del cuerpo puede acarrear una significativa absorción sistémica incluso si no se utiliza la cura oclusiva.

En niños, la administración de corticoides tópicos debe limitarse a períodos cortos de tiempo y a la mínima cantidad efectiva del producto.

En presencia de una infección, debe instituirse una terapia apropiada. De no tener lugar una rápida mejoría, debe suspenderse el tratamiento con SYNALAR Neomicina hasta que se haya controlado la infección.

Debido al riesgo potencial de nefrotoxicidad y ototoxicidad, no se recomienda su uso prolongado o en grandes cantidades en el tratamiento de estados patológicos de la piel consecutivos a quemaduras extensas, úlceras tróficas y otras afecciones que puedan favorecer la absorción de la Neomicina.

No se recomienda el uso de SYNALAR Neomicina mediante cura oclusiva.

Al igual como ocurre con cualquier antibiótico, su uso prolongado o en grandes cantidades puede favorecer la proliferación de microorganismos no sensibles. En caso de sobreinfección, deben tomarse las medidas oportunas.

Este preparado no está indicado para uso oftálmico.

## **ADVERTENCIAS**

Se informa a los deportistas que este medicamento contiene un componente que puede establecer un resultado analítico de control del dopaje como positivo.

## **INCOMPATIBILIDADES**

No se han descrito incompatibilidades formales para este medicamento.

## **EMPLEO DURANTE EL EMBARAZO**

En animales de laboratorio se ha sugerido que el tratamiento de hembras gestantes con corticoides tópicos puede estar relacionado con una mayor incidencia de anomalías fetales. Aunque en humanos no se ha demostrado que este tipo de fármacos ejerza un efecto adverso sobre el embarazo, no se ha establecido su completa seguridad en mujeres gestantes. Por lo tanto, no se recomienda su uso prolongado o en grandes cantidades en este tipo de pacientes, especialmente durante el primer trimestre del embarazo.

## **EFECTOS SECUNDARIOS**

En caso de administración reiterada de corticoides tópicos, se ha descrito la aparición de los siguientes efectos locales: quemazón, picor, irritación, sequedad, foliculitis, hipertrichosis, erupciones acneiformes, hipopigmentación, dermatitis perioral, dermatitis alérgica de contacto, maceración dérmica, infección secundaria, atrofia cutánea, estrías y miliaria.

La Neomicina, administrada tópicamente, puede producir ototoxicidad y nefrotoxicidad.

Se han descrito casos de reacciones de hipersensibilidad a la Neomicina cuya prevalencia, según la literatura médica actual, va en aumento.

## **INTOXICACIÓN Y SU TRATAMIENTO**

En caso de ingestión accidental pueden aparecer cuadros de taquicardia y elevaciones ocasionales de tensión arterial, que ceden sin necesidad de tratamiento médico.

En caso de sobredosis o ingestión accidental, consultar al Servicio de Información Toxicológica, Teléfono (91) 562 04 20.

## **CONDICIONES DE CONSERVACIÓN**

Presérvese del calor.

## **PRESENTACIONES**

Tubo de 30 g y 60 g de crema.

CON RECETA MÉDICA

LOS MEDICAMENTOS DEBEN MANTENERSE  
FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.

Yamanouchi Pharma, S.A.

Centro Empresarial El Plantío - c/ Ochandiano, 10 - 28023 Madrid