



For Outdoor Use Around
the Home Only

Spectracide®



TRIAZICIDE® INSECT KILLER

ONCE & DONE!

CONCENTRATE₂

Insecticida concentrado₂

Kills 180+ Listed Insects by Contact

Kills Above & Below Ground

Fast-Acting Formula



Active Ingredient

Gamma-Cyhalothrin 0.08%

Other Ingredients 99.92%

*For terms of guarantee, see back panel.

*Argentine, southern, field, Allegheny mound, Florida carpenter, cornfield, honey, pavement, nuisance.

For lawns & landscapes

KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN MANTÉNGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

CAUTION See back booklet for additional precautionary statements.

Net 32 fl oz (1 qt/946 mL)

PRECAUCIÓN Consulte el folleto en la parte posterior para conocer las declaraciones preventivas adicionales.

17-13877

mosca de la nuez (adulta), hormigas, chinche, chinche hedionda, chinches, insecto occidental de la semilla de la conífera (leaffooted bug), áfido del nogal, hickory shuckworm, barrenador de la nuez pecana, pecan weevil, pulgón amarillo del pacánero, pecan spittelebug, filoxera del pacánero.

CANTIDAD DE DÍAS QUE SE DEBEN ESPERAR ENTRE LA ÚLTIMA APLICACIÓN Y LA COSECHA

ÁRBOLES FRUTALES Y DE NUECES	IPC
Manzano, Manzano silvestre, Nispero, Mayhaw, Peral asiático, Peral, Membrillo	21
Chabacano, Cerezo dulce, Cerezo agrio, Nectarina, Durazno, Ciruelo (Chickasaw, Damson, Japonés), Ciruela y Ciruelas pasa	14
Almendra, Nuez de haya, Nuez de Brasil, Nogal blanco, Nuez de la India, Castaña, Chinquapin, Avellana (hazelnut), Nogal americano, Macadamia, Nogal (negro o inglés), y Nuez pecana	14
IPC - Intervalo previo a la cosecha	

ALMACENAMIENTO Y ELIMINACIÓN

Almacenamiento del pesticida: Guarde en un lugar fresco y seco, lejos del calor y del fuego.

Eliminación del pesticida: Si está vacío: Envase no rellenable. No vuelva a usar ni rellener este envase. Ofrézcalo para reciclar, si existe esa opción. Si está parcialmente vacío: Llame a su servicio de eliminación de desechos más cercano para obtener instrucciones de eliminación. Nunca tir el producto restante por ningún drenaje interno ni externo.

DECLARACIONES PREVENTIVAS

Riesgos para los seres humanos y los animales domésticos

PRECAUCIÓN. Nocivo si se ingiere. Lávese muy bien las manos con agua y jabón después de manipularlo y antes de comer, beber, masticar chicle, usar tabaco o usar el baño.

PRIMEROS AUXILIOS

Si se ingiere: Llame inmediatamente a un centro de control de envenenamientos o a un médico para recibir instrucciones de tratamiento. Si la persona puede tragar, haga que beba poco a poco un vaso de agua. No induzca el vómito a menos que así se lo indique un centro de control de envenenamientos o un médico. No administre nada por la boca a una persona que haya perdido el conocimiento.

Cuando llame a un centro de control de envenenamientos o a un médico para recibir instrucciones de tratamiento, tenga a la mano el envase o la etiqueta del producto.

Riesgos para el medio ambiente

Este producto es extremadamente tóxico para los peces. Para proteger el medio ambiente, no permita que el pesticida entre o escorra en alcantarillas pluviales, zanjas de drenaje, cunetas ni agua de superficie. Aplicar este producto cuando el clima está tranquilo y no se pronostique lluvia dentro de las siguientes 24 horas asegurará que el pesticida no vuela con el viento o se lave con la lluvia del área tratada. Enjuagar el equipo de aplicación sobre el área tratada ayudará a evitar el escorrimiento a masas de agua o sistemas de drenaje. La deriva y el escorrimiento desde las áreas tratadas pueden resultar peligrosos para los organismos acuáticos de las zonas vecinas.

Este producto es extremadamente tóxico para las abejas que están expuestas al tratamiento directo o a los residuos que queden en cultivos o malezas en flor. No aplique este producto ni permita que pase a los cultivos o malezas en flor en caso que haya abejas volando por el área tratada.

STOP READ ENTIRE LABEL BEFORE USE.
PEEL HERE RESEALABLE LABEL
ABRA AQUÍ ETIQUETA RESELLABLE

TRIAZICIDE® INSECT KILLER
ONCE&DONE!®
 CONCENTRATE Insecticide concentrate

Covers up to
5,120 sq ft of Lawn

Non-Staining*

Protects Lawns, Vegetables, Fruit & Nut Trees, Roses, Flowers, Trees, Shrubs

PRODUCT FACTS

WHAT IT DOES:

Kills grubs, ants*, fleas, chinch bugs, mosquitoes, sod webworms, aphids, beetles, whiteflies, mites, deer ticks, Japanese beetles, European crane flies and other listed insects.

*Argentine, southern, field, Allegheny mound, Florida carpenter, cornfield, honey, pavement, nuisance.

WHERE TO USE:

Outdoors

QUESTIONS & COMMENTS:

Call 1-800-917-5438 or visit our website at www.spectracide.com

*NOTE: This product is non-staining to most home siding depending on age and cleanliness. However, before using in areas where the spray may contact home siding (vinyl siding in particular), test in an inconspicuous area and recheck in a few hours. Do not use if any staining is observed.

'GUARANTEED RESULTS OR YOUR MONEY BACK'

If you are not satisfied with this product for any reason, send your written request for a refund to the address below, together with the original dated store receipt showing the price you paid. Please allow 6-8 weeks for processing.

NOTICE: To the extent consistent with applicable law, buyer assumes all responsibility for safety and use not in accordance with directions.

NOTA: Hasta el grado que sea compatible con la legislación pertinente, el comprador asume toda la responsabilidad para seguridad y uso que no esté de acuerdo con las instrucciones.

Distributed by Spectrum Group
 Div. of United Industries Corp.
 PO Box 142642, St. Louis, MO 63114-0642
 EPA Reg. No. 9688-277-8845
 EPA Est. Nos. 9688-MO-1 (1), 39609-MO-1 (BM)
 Circled letter is first letter of lot number.
 17-13299 © 2009 UIC

PROOF OF PURCHASE

FPO UPC
0 71121 95829 7

STOP. READ ENTIRE LABEL BEFORE USE.

DIRECTIONS FOR USE

It is a violation of Federal law to use this product in a manner inconsistent with its labeling.



Do not allow children or pets into the treated area until dry.

- Do not water the treated area to the point of runoff.
- Do not make applications during rain.
- All outdoor applications must be limited to spot or crack-and-crevice treatments only, except for the following permitted uses:
 1. Treatment to soil or vegetation around structures
 2. Applications to lawns, turf and other vegetation
 3. Applications to building foundations, up to a maximum height of 3 ft. Other than applications to building foundations, all outdoor applications to impervious surfaces such as sidewalks, driveways, patios, porches and structural surfaces (such as windows, doors and eaves) are limited to spot and crack-and-crevice applications only.
- Application is prohibited directly into sewers or drains, or to any area like a gutter where drainage to sewers, storm drains, water bodies, or aquatic habitat can occur. Do not allow the product to enter any drain during or after application.

In New York State, this product may not be applied to lawns within 100 ft of a coastal marsh, or stream that drains directly into a coastal marsh.

HOW TO MIX AND APPLY

STEP 1: Determine size of spraying job. For lawns and vegetables, measure the area to be sprayed. For trees, shrubs and flowers, apply as a thorough cover spray. Make applications when insects first appear. Applications should be repeated only as directed to maintain control.

STEP 2: Use a clean sprayer. Carefully measure and mix the amount of product and water as indicated in the directions. It is always a good idea to wear gloves when handling pesticides. Kitchen utensils such as measuring cups and measuring spoons should not be used for food purposes after use with pesticides.

STEP 3: Spray as directed. Thorough coverage is important.

STEP 4: Flush sprayer with clean water after each use.

See directions for list of use sites, plants and insects controlled. Use the rate given in the directions for the type of insect you want to control on the site or plant you are spraying.

MEASUREMENT CONVERSIONS

1 Tbsp = 3 tsp

1 fl oz = 6 tsp or 2 Tbsp

6 fl oz = $\frac{3}{4}$ cup

$\frac{1}{2}$ Tbsp in 3 gallons of water = $1\frac{1}{2}$ tsp in 1 gallon of water

2 Tbsp in 3 gallons of water = 2 tsp in 1 gallon of water

#NOTE: This product is non-staining to most home siding depending on age and cleanliness. However, before using in areas where the spray may contact home siding (vinyl siding in particular), test in an inconspicuous area and recheck in a few hours. Do not use if any staining is observed.

LAWNS

UNDERGROUND INSECTS/THATCH-INFESTING INSECTS including blue grass billbug (adult), black turfgrass *Ataeus* (adult), chiggers, chinch bugs, white grubs (Japanese beetle, European chafer, southern chafer), dung beetle and hyperdes weevils (adult). European crane flies and mole crickets (nymphs and young adults). Mix 1.5 fl oz (3 Tbsp) in 1 gallon of water to treat 120 sq ft. For subsurface insect control (mole crickets, grubs), water treated area with additional $\frac{1}{4}$ to $\frac{1}{2}$ inch of water for optimum results. Do not apply more than seven times per year per location.

SURFACE INSECTS including ants*, armyworms, cockroaches, crickets, cutworms, earwigs, fleas, lawn moths (sod webworms), millipedes, mosquitoes, palmetto bugs, sowbugs, mites, spittlebugs and waterbugs. Thoroughly wet down grass a few hours before applying. Mix 1.5 fl oz (3 Tbsp) in 1 gallon of water to cover 240 sq ft. Add additional watering or mowing for 24 hours after application for optimum control of surface insects. For heavy infestations or to kill lone star ticks, brown dog ticks, American dog ticks and deer ticks (which may transmit Lyme

Disease) use rate can be increased to 6 fl oz/1,000 sq ft. Do not apply more than 14 times per year per location.
WHEN TO TREAT: Treat the following pests during the months indicated or when first noticed.

JAN	FEB	MAR	APR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEP	OCT	NOV	DEC
			Billbugs				Grubs				
				Dung beetle grubs							
					Hyperdes weevils						

Treat ants* and other insects when they first appear or you notice lawn damage.

*Argentine, southern, field, Allegheny mound, Florida carpenter, cornfield, honey, pavement, nuisance.

PESTS OUTSIDE THE HOME

Mix 1.5 fl oz (3 Tbsp) in 1 gallon of water and apply as a continuous band of insecticide around building foundation and around windows, doors, eaves, vents and other areas to greatly reduce the potential for entry by crawling pests. For easier application, remove debris and leaf litter from next to the foundation, cut back vegetation and branches that touch the foundation, and move or rake back rocks, deep mulch or other potential pest harborage next to the foundation. Apply a 3-foot band around the structure and upward along the foundation to 3 feet and around windows, doors and roof overhangs. Apply as a coarse spray to thoroughly and uniformly wet the foundation and/or band area so that the insecticide will reach the soil or thatch level where pests may be active. One gallon will treat 240 sq ft of surface area. Repeat application every eight weeks.

OUTDOOR SURFACES USE: For control of ants*, centipedes, cockroaches, crickets, fleas, millipedes, mosquitoes, palmetto bugs, scorpions, sowbugs, pillbugs, spiders, deer ticks and waterbugs. Mix 1.5 fl oz (3 Tbsp) in 1 gallon of water and apply as a residual treatment to ornamental plants next to foundations of buildings and to surfaces of buildings, porches, screens, window frames, eaves, patios, garages and other similar areas where these pests are active. Repeat application every eight weeks.

*Argentine, southern, field, Allegheny mound, Florida carpenter, cornfield, honey, pavement, nuisance.

ORNAMENTAL TREES, SHRUBS AND FLOWERS

For use on ornamental trees, shrubs and flowers such as but not limited to: Ageratum, Arborvitae, Arizona Cypress, Ash, Aster, Azaleas, Begonia, Birch, Boxwood, Box Elder, Camellias, Carnations, Chrysanthemums, Non-bearing Citrus, Coleus, Common Ninebark, Conifers, Douglas Fir, Elm, English Ivy, Euonymus, Exacum, Weeping Fig, Fir, Gladioli, Gold Balls, Hawthorn, Holly, Honeysuckle, Hypoestes, Ivy, Juniper, Lilac, Locust, Maple, Marigold, Mimosas, Mock Orange, Nannyberry, Oak, Orchid, Palm, Pansy, Pea Shrub, Petunia, Philodendron, Pine, Ornamental Plum, Poinsettia, Poplar, Tulip Poplar, Rhododendron, Roses, Snapdragon, Snowberry, Spruce, Taxus, Willow, Zinnia.

To control ants*, aphids, armworms, azalea caterpillar, bagworms, black vine weevil (adult), box elder bugs, budworms, California oakworm, cankerworms, cockroaches, crickets, cutworms, eastern tent caterpillar, elm leaf beetles, European sawfly, fall webworm, flea beetles, forest tent caterpillar, gypsy moth larvae, Japanese beetles (adults), June beetles (adults), lace bugs, leaf-eating caterpillars, leafhoppers, leafminers (adults), leaf rollers, leaf skeletonizers, midges, oleander moth larvae, pillbug, pine sawfly, pine shoot beetles, pinipet moths, plant bugs, root weevil, sawfly, scale insects (crawlers), spiders, spittlebugs, striped beetles, striped oakworm, thrips, tip moth, tussock moth larvae: Mix 0.75 fl oz (1½ Tbsp) in 1 gallon of water.

To control broadmades, brown softscale, California redscale (crawler), clover mites, mealybugs, pineneedle scale (crawler), spider mites and whiteflies: Mix 1.5 fl oz (3 Tbsp) in 1 gallon of water.

*Argentine, southern, field, Allegheny mound, Florida carpenter, cornfield, honey, pavement, nuisance.

USE TIPS

- For best results, apply early before insect populations are high.
- For scale control, treat entire plant, including stem, trunks and twigs.
- For bagworm control, apply when bagworm larvae begin to hatch.
- For best results, apply to both sides of plant leaves and all plant surfaces where insects are present.

VEGETABLES

Mix 1.5 fl oz (3 Tbsp) in 1 gallon of water and apply to 300 sq ft. Apply when insects appear or when damage occurs. Spray to wet all infested plant surfaces.

Do not apply more than five times per growing season to corn. For all other crops, do not apply more than nine times per growing season.

For use on Broccoli, Brussels Sprouts, Cabbage, Cavallo Broccoli, Cauliflower, Chinese Broccoli, Chinese Cabbage, Chinese Mustard and Kohlrabi to control: alfalfa looper, cabbage looper, imported cabbageworm, southern cabbageworm, cutworm, cabbage webworm, diamondback moth, armyworm, beet armyworm, fall armyworm, yellow-striped armyworm, corn earworm, flea beetle, Japanese beetle (adult), grasshopper, leafhopper, plant bug, including lygus bug, stink bug, meadow spittlebug, aphid, whitefly, thrips, spider mite.

For use on Corn (sweet and pop) to control: cutworm, western bean cutworm, corn earworm, green cloverworm, meadow spittlebug, tobacco budworm, European corn borer, southwestern corn borer, stalk borer, hop vine borer, armyworm, beet armyworm, western corn rootworm beetle (adult), northern corn rootworm beetle (adult), southern corn rootworm beetle (adult), Mexican corn rootworm beetle (adult), bean leaf beetle, cereal leaf beetle, Japanese beetle (adult), stink bug (adult), stink bug, grasshopper, corn leaf aphid, English grain aphid, chinch bug, green bug. Sweet Corn only: southern armyworm, western bean cutworm, tarnished plant bug, aster leafhopper, aphid, spider mite, corn silkfly (adult).

For use on Onion (bulb) and Garlic to control: cutworm, seedcorn maggot (adult), onion maggot (adult), leafminer (adult), armyworm, onion thrips, tobacco thrips, western flower thrips, flower thrips, aphid, plant bug, stink bug.

For use on Tomato, Tomatillo, Peppers (bell and nonbell), Eggplant, Ground Cherry and Pepino to control: cabbage looper, cutworm spp., hornworm, tomato fruitworm, tobacco budworm, tomato pinworm, beet armyworm, southern armyworm, yellow-striped armyworm, fall armyworm, European corn borer, leafminer, Colorado potato beetle, flea beetle, grasshopper, leafhopper, aphid, whitefly, meadow spittlebug, stink bug, plant bug, stalk borer, blister beetle, Japanese beetle (adult), vegetable weevil, cucumber beetle (adult).

For use on Asparagus Beans, Snap Beans, Wax Beans, Black-Eyed Peas, Garden Peas, Green Peas and Sugar Snap Peas to control: cutworm spp., green cloverworm, imported cabbageworm, saltmarsh caterpillar, velvetleaf caterpillar, Mexican bean beetle, corn earworm, painted lady butterfly (larvae), European corn borer, looper spp., western bean cutworm, armyworm, yellow-striped armyworm, western yellow-striped armyworm, leaf beanskeletonizer, webworm spp., leafier spp., alfalfa caterpillar, stalk borer, cucumber beetle (adult), corn rootworm beetle (adult), flea beetle (adult), blister beetle, bean leaf beetle, Japanese beetle (adult), leafhopper spp., fleas hopper spp., three-cornered alfalfa hopper, meadow spittlebug, stink bug spp., plant bug spp., grasshopper, thrips spp., aphid spp.

For use on Lettuce (head and leaf) to control: alfalfa looper, cabbage looper, imported cabbageworm, cutworm spp., saltmarsh caterpillar, green cloverworm, armyworm, beet armyworm, fall armyworm, corn earworm, European corn borer, flea beetle spp., Japanese beetle (adult), vegetable beetle (adult), grasshopper, leafhopper, plant bug, stink bug, meadow spittlebug.

NUMBER OF DAYS TO WAIT BETWEEN THE LAST APPLICATION AND HARVEST	
VEGETABLES	PHI
Broccoli, Brussels Sprouts, Cabbage, Cavallo Broccoli, Cauliflower, Chinese Broccoli, Chinese Cabbage, Chinese Mustard, Kohlrabi, Lettuce (head and leaf)	1
Tomato, Tomatillo, Peppers (bell and nonbell), Eggplant, Ground Cherry and Pepino	5
Onions (bulb), Garlic	14
Corn (sweet and pop)	21
Asparagus Beans, Snap Beans, Wax Beans, Black-Eyed Peas, Garden Peas, Green Peas and Sugar Snap Peas	7
Lettuce (leaf and head)	1
PHI = Pre-Harvest Interval	

FRUIT AND NUT TREES

Mix 1.5 fl oz (3 Tbsp) in 1 gallon of water and apply to 300 sq ft. Apply when insects appear or when damage occurs. Spray to wet all infested plant surfaces.

For fruit trees do not apply more than nine times per year, and only apply five times after blooms

have formed. For nut trees do not apply more than six times per year, and only apply five times after blooms have formed.

For use on Apple, Crabapple, Loquat, Mayhaw, Oriental Pear, Pear and Quince to control: leafhopper spp., coding moth, tufted apple budworm, Oriental fruit moth, lesser appleworm, green fruitworm, tent caterpillar spp., tentiform leaf miner spp., apple maggot (adult), pear sawfly, plum curculio, Japanese beetle, plant bug, stink bug, leafhopper, periodical cicada, apple aphid, rosy apple aphid, peach psylla, San Jose scale (on fruit only).

For use on Apricot, Sweet Cherry, Tart Cherry, Nectarine, Peach, Plum (Chickasaw, Damson, Japanese), Plumcot and Prune to control: leafroller spp., peach twig borer, Oriental fruit moth, peachtree borer spp., green fruitworm, tent caterpillar spp., American plum borer, cherry fruit fly spp. (adult), plum curculio, rose chafer, Japanese beetle, plant bug, stink bug, leafhopper spp., periodical cicada, black cherry aphid.

For use on Almond, Beech Nut, Brazil Nut, Butternut, Cashew, Chestnut, Chinquapin, Filbert (Hazelnut), Hickory Nut, Macadamia Nut, Walnut (Black and English) and Pecan to control: leafroller spp., navel orangeworm, coding moth, fiberworm, peach twig borer, peach husk fly spp. (adult), ants, plant bug, stink bug, chinch bug, leaffooted bug, walnut aphid, hickory shuckworm, pecan casebearer spp., pecan weevil, pecan aphid spp., pecan spittlebug, pecan phylloxera spp.

NUMBER OF DAYS TO WAIT BETWEEN THE LAST APPLICATION AND HARVEST	
FRUIT AND NUT TREES	PHI
Apple, Crabapple, Loquat, Mayhaw, Oriental Pear, Pear, Quince	21
Apricot, Sweet Cherry, Tart Cherry, Nectarine, Peach, Plum (Chickasaw, Damson, Japanese), Plumcot and Prune	14
Almond, Beech Nut, Brazil Nut, Butternut, Cashew, Chestnut, Chinquapin, Filbert (Hazelnut), Hickory Nut, Macadamia Nut, Walnut (Black and English) and Pecan	14

PHI = Pre-Harvest Interval

STORAGE AND DISPOSAL

Pesticide Storage: Store in a cool dry area away from heat or open flame.

Pesticide Disposal: If empty: Nonrefillable container. Do not reuse or refill this container. Offer for recycling, if available. If partly filled: Call your local solid waste agency for disposal instructions. Never place unused product down any indoor or outdoor drain.

PRECAUTIONARY STATEMENTS

Hazards to Humans and Domestic Animals

CAUTION: Harmful if swallowed. Wash hands thoroughly with soap and water after handling and before eating, drinking, chewing gum, using tobacco or using the toilet.

FIRST AID

If Swallowed: Call a Poison Control Center or doctor immediately for treatment advice. Have person sip a glass of water if able to swallow. Do not induce vomiting unless told to do so by a Poison Control Center or doctor. Do not give anything by mouth to an unconscious person.

Have the product container or label with you when calling a Poison Control Center or doctor for treatment advice.

Environmental Hazards

This product is extremely toxic to fish. To protect the environment, do not allow pesticide to enter or run off into storm drains, drainage ditches, gutters or surface waters. Applying this product in calm weather when rain is not predicted for the next 24 hours will help to ensure that wind or rain does not blow or wash pesticide off the treatment area. Rinsing application equipment over the treated area will help avoid runoff to water bodies or drainage systems. Drift and runoff from treated areas may be hazardous to aquatic organisms in neighboring areas.

This product is highly toxic to bees exposed to direct treatment or residues on blooming crops or weeds. Do not apply this product or allow it to drift to blooming crops or weeds if bees are visiting the treatment area.

ALTO. LEA TODA LA ETIQUETA ANTES DE USAR.

MODO DE EMPLEO

Se considera una violación a la ley federal usar este producto de una manera que no sea la indicada en la etiqueta.



No permita que los niños ni las mascotas entren en el área tratada hasta que se seque.

- No riegue el área tratada hasta el punto de escorrimiento.
- No realice aplicaciones durante lluvias.
- Todas las aplicaciones en espacios exteriores deben limitarse a tratamientos localizados o para tratar grietas y rajaduras exclusivamente, salvo los siguientes usos permitidos:
 1. Tratamiento del suelo o vegetación alrededor de estructuras
 2. Aplicaciones a céspedes y otra vegetación
 3. Aplicaciones a cimientos de edificios, hasta una altura máxima de 3 pies. Aparte de las aplicaciones a cimientos de edificios, todas las aplicaciones en superficies exteriores a superficies impermeables como aceras, caminos de entrada de automóviles, patios, porches y superficies estructurales (como ventanas, puertas y aleros) se limitan a aplicaciones localizadas y para el tratamiento de grietas y rajaduras exclusivamente.
- Se prohíbe la aplicación directa a alcantarillas o drenajes, así como a cualquier área dentro o debajo de una cubeta en la que pueda producirse el drenaje a alcantarillas, alcantarillas pluviales, masas de agua o hábitats acuáticos. No permita que el producto entre en ningún drenaje durante o después de su aplicación.

En el Estado de Nueva York, no se podrá aplicar este producto en áreas de césped ubicadas a una distancia de hasta 100 pies de un pantano costero o de un arroyo que desembocue directamente en un pantano costero.

CÓMO MEZCLAR Y APlicar

PASO 1: Determine el tamaño de la tarea de rociado a realizar. Para céspedes y hortalizas, mida el área que se va a rociar. En árboles, arbustos y flores, aplique como un rociado que cubra por completo. Realice aplicaciones en cuanto aparezcan los insectos por primera vez. Sólo se debe repetir el tratamiento de acuerdo a las indicaciones, con la finalidad de mantener la plaga bajo control.

PASO 2: Use un rociador limpio. Mida cuidadosamente y mezcle la cantidad de producto y de agua como se indica en las instrucciones. Es siempre recomendable usar guantes al manipular pesticidas. No deben utilizarse utensilios de cocina tales como tazas o cucharas de medida para preparar alimentos después de usarlos con pesticidas.

PASO 3: Rocíe como se indica. Es importante que la cobertura sea completa.

PASO 4: Enjuague bien el rociador con agua limpia después de cada uso.

Consulte las instrucciones para obtener una lista de los lugares y las plantas donde se usa, así como de los insectos controlados. Use la dosis que se indica en las instrucciones para el tipo de insecto que desea controlar en el lugar o planta que va a rociar.

CONVERSIÓNES DE MEDIDAS

1 cda. sopera = 3 cdas.

1 onza líquida = 6 cdas. ó 2 cdas. sopera

6 onzas líquidas = $\frac{3}{4}$ taza

1 ½ cdas. soperas en 3 galones de agua = 1 ½ cdas. en 1 galón de agua

2 cdas. soperas en 3 galones de agua = 2 cdas. en 1 galón de agua

NOTA: Esta producto en general no mancha la mayoría de los revestimientos del hogar, dependiendo de la antigüedad y limpieza de los mismos. No obstante, antes de utilizarlo en áreas donde el rocio pueda entrar en contacto con el revestimiento del hogar (en particular con revestimientos vinílicos), pruébelo en un lugar que no sea muy visible y verifique su efecto unas horas más tarde. No lo utilice si observa manchas.

CÉSPEDES

INSECTOS SUBTERRÁNEOS/INSECTOS QUE INFECTAN EL QUINCHADO entre los que se incluyen gorgojos de pasto azul anual (adultos), escarabajo negro del césped del género *Athenius* (adulto), escarabajo del género *Trombicula*, chinches, larvas blancas (escarabajo japonés, gusano blanco europeo (European chafer), escarabajo marrón (Southern chafer)), escarabajos del estiércol y gorgojos

(Hyperodes spp.) (adulto), típulas europeas y grillos topos (ninfas y adultos jóvenes). Mezcle 1.5 onzas líquidas (3 cdas. soperas) en 1 galón de agua para tratar 120 pies cuadrados. Para el control de insectos subterráneos (grillos topos, larvas), riegue el área tratada con ¼ a ½ pulgada más de agua para obtener óptimos resultados. No lo aplique más de siete veces por año por lugar.

INSECTOS DE SUPERFICIE entre los que se incluyen hormigas*, gusanos soldados, cucarachas, grillos, gusanos cortadores, tijeretas, pulgas, orugas del césped, milpiés, mosquitos, cucaracha de caño, cochinillas de la humedad, ácaros, cigarrillas y chinches de agua. Humedezca el pasto completamente rociando con agua algunas horas antes de la aplicación. Mezcle 1.5 onzas líquidas (3 cdas. soperas) en 1 galón de agua para cubrir 240 pies cuadrados. Para lograr el mejor control de los insectos de superficie no negue más ni corre hasta después de transcurridas 24 horas de la aplicación. Para infestaciones severas o para matar garrapatas lone star, garrapatas marrones del perro, garrapatas americanas del perro y garrapatas de los venados (que pueden transmitir la enfermedad de Lyme) la dosis de uso se puede aumentar hasta 6 onzas líquidas/1,000 pies cuadrados.

No lo aplique más de 14 veces por año por lugar.

CUANDO APLICAR EL TRATAMIENTO: Trate los siguientes insectos nocivos durante los meses indicados o cuando note su presencia por primera vez.

ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
		Gorgojos			Larvas						
		Larvas del escarabajo del estiércol									
		Gorgojos (Hyperodes spp.)									
Trate las hormigas* y otros insectos cuando éstos aparezcan por primera vez o cuando observe daños en el césped.											

*Argentinas, del sur, de campo, Allegheny mound, carpinteras de la Florida, de los campos de maíz, de la miel, del pavimento, molestas.

INSECTOS NOCIVOS FUERA DEL HOGAR

Mezcle 1.5 onzas líquidas (3 cdas. soperas) en 1 galón de agua y aplique una franja continua de insecticida alrededor de los cimientos del edificio y de las ventanas, puertas, áleros, respiraderos y otras zonas para reducir en gran medida la posibilidad de que ingresen insectos nocivos rastreadores. Para que la aplicación sea más fácil, quite los restos y las hojas secas de la zona próxima a los cimientos, corte y retire la vegetación y las ramas que están en contacto con los cimientos, y mueva o rastreille las rocas, el mantillo profundo u otros posibles reservorios de insectos nocivos próximos a los cimientos. Aplique una franja de 3 pies alrededor de la estructura. Desde abajo hacia arriba, a lo largo de los cimientos hasta alcanzar una altura de 3 pies, y alrededor de las ventanas, puertas y salientes del techo. Aplique como rocío grueso a efectos de mojar bien y de manera uniforme los cimientos, la zona de la franja o ambos, de modo que el insecticida llegue hasta el suelo o hasta el nivel del quinchedo donde los insectos nocivos pueden estar activos. Con un galón se trata una superficie de 240 pies cuadrados. Repita la aplicación cada ocho semanas.

USO EN SUPERFICIES EXTERIORES: Para controlar hormigas*, ciempiés, cucarachas, grillos, pulgas, milpiés, mosquitos, cucarachas de caño, alacranes, cochinillas de la humedad, cochinillas, arañas, garrapatas de los venados y chinches de agua. Mezcle 1.5 onzas líquidas (3 cdas. soperas) en 1 galón de agua y aplique como tratamiento de acción residual a plantas ornamentales próximas a los cimientos de edificios y a las superficies de edificios, porches, mosquiteros, marcos de ventanas, áleros, patios, cocheras y otras zonas similares donde hay actividad de estos insectos nocivos. Repita la aplicación cada ocho semanas.

*Argentinas, del sur, de campo, Allegheny mound, carpinteras de la Florida, de los campos de maíz, de la miel, del pavimento, molestas.

ÁRBOLES, ARBUSTOS Y FLORES ORNAMENTALES

Para usar en árboles, arbustos y flores ornamentales como por ejemplo: Agerato, árbol de la vida, ciprés de Arizona, tromo, aster, azaleas, begonía, abedul, ból, arce, camelias, claveles, cerezo (ornamental), crismantemos, cítricos sin fructificación, coleo, fisicápolo, confíeras, abeto douglas, olmo, hiedra inglesa, evónimo, violeta persa, ficus benjamina, gladiolos, narciso de olor, espino, acebo, madreselva, hypoestes, hiedra, ebro, lirio, algarrobo, arce, caléndula, mimosa, Mock orange, viburno, roble, orquídea, palma, pensamiento, caraguana, petunia, filodendro, pino, ciruelo ornamental, nochebuena, álamo blanco o negro, tulipanero, rododendro, rosas, boca de dragón, bolita de nieve, abeto, tejo, sauce, zinia.

Para controlar hormigas*, áfidos, gusanos soldados, oruga de las azaleas, gusanos del saco, gorgojos de los invasadores (adultos), insectos del arce, gusanos de las yemas, oruga de California (*Phryganidea californica*), gusanos medidores (*Paleacrita vernata* y *Alsophila pomonaria*), cucarachas, grillos, gusanos cortadores, lagartas del este, escarabajo de la hoja del olmo, defoliadores de pinos, gusano leñatero, crismóleidos, oruga del álamo temblón, larvas de polilla gitana, escarabajos japoneses (adultos), escarabajos de junio (adultos), insectos de encate, orugas que se alimentan de hojas, saltillos, gusanos minadores (adultos), enroladores de hojas, defoliadores, jejenes, larvas de *Syntomeida epilais*, cochinilla, defoliador del pino, escarabajo de los brotes de pino, barrenador de los brotes del pino, chinches, gorgojos de la ráza, mosca barrenadora, cochinillas (etapa móvil), arácnas, cigarrillas, escarabajos rayados, oruga rayada (*Anisota senatoria*), trípids, barrenador de los brotes, orugas peludas: Mezcle 0.75 onzas líquidas (1½ cda. soperas) en 1 galón de agua.

Para controlar ácaros blancos, cochinillas blandas, cochinilla roja de California (etapa móvil), ácaros de trébol, cochinillas, cochinilla blanca del pino (etapa móvil), ácaros tetraniquidos y moscas blancas: Mezcle 1.5 onzas líquidas (3 cdas. soperas) en 1 galón de agua.

*Argentinas, del sur, de campo, Allegheny mound, carpinteras de la Florida, de los campos de maíz, de la miel, del pavimento, molestas.

CONSEJOS SOBRE EL USO

- Para obtener mejores resultados, aplique antes de que las poblaciones de insectos sean grandes.
- Para el control de las cochinillas, trate toda la planta, incluyendo el tallo, troncos y ramitas.
- Para el control de los gusanos del saco (bagworm), aplique cuando las larvas de los gusanos comiencen a salir.
- Para obtener mejores resultados, aplique en ambos lados de las hojas y en todas las superficies de la planta donde haya insectos.

HORTALIZAS

Mezcle 1.5 onzas líquidas (3 cadas. soperas) en 1 galón de agua y aplique a 300 pies cuadrados. Aplique cuando aparezcan los insectos o cuando ocurra daño. Rocié para mojar todas las superficies de las plantas infestadas.

No aplique al maíz más de cinco veces por temporada de cultivo. Para todos los demás cultivos, no aplique más de nueve veces por temporada de cultivo.

Para usar en brócoli, coles de Bruselas, col, brócoli cavalo, coliflor, brócoli chino, col China, mostaza parda y colinabo, para controlar: gusano medidor de la alfalfa, falso medidor de la col, gusano importado de la col, gusano sureño de la col, gusano cortador, taladro del tallo, polilla de la col, gusano soldado, gusano soldado del betabel, gusano cogollero, gusano pirero, isoca del maíz, crismóleidos, escarabajo japonés (adulto), saltamontes, saltarilla, chinche, incluyendo chinche lugus, chinche hedionda, cigarrilla espumadora, áfido, mosca blanca, trípids, ácaros tetraniquidos.

Para usar en maíz (duce y para palomitas) para controlar: gusano cortador, gusano cortador del frijol occidental, isoca del maíz, gusano verde del trébol, cigarrilla espumadora, gusano cogollero del tabaco, barrenador europeo del maíz, barrenador del maíz del sureste, barrenador del tallo, barrenador (*Hydractinia immanis*), gusano soldado, gusano soldado del betabel, gusano de la raíz del maíz del norte (adulto), gusano de la raíz del maíz del norte (adulto), gusano de la raíz del maíz del sur (adulto), gusano de la raíz del maíz de México (adulto), escarabajo de la hoja del frijol, escarabajo de la hoja del cereal, escarabajo japonés (adulto), escarabajo (*Carpophilus lugubris*) (adulto), chinche hedionda, saltamontes, pulgón del maíz, pulgón de la espiga, chinches, chinche verde.

Solamente en maíz dulce: gusano soldado sureño, gusano cortador del frijol occidental, chinche lugus, cicadáleidos, áfido, ácaros tetraniquidos, mosca del maíz (adulta).

Para usar en cebolla (bulbo) y ajo para controlar: gusano cortador, gusano de la semilla del maíz (adulto), mosca de la cebolla (adulta), gusanos minadores (adulto), gusano soldado, trípids de la cebolla, trípids del tabaco, trípids occidental de las flores, trípids de las flores, áfido, chinche, chinche hedionda, saltarillas, cigarrillas periódicas, áfido del manzano, áfido rosado del manzano, psílido del peral, piollo de San José (sólo en frutos).

Para usar en chabacano, cerezo dulce, cerezo agrio, naranja, durazno, ciruelo (*Chickasaw*, *Damson*, *Japanés*), ciruela y ciruelas pasa para controlar: larvas de orugas, anarsia, cítrida, polilla de los melocotoneros, gusano verde del fruto, lagartas (gusanos tenderos), *American plum borer*, mosca de la cereza (adulta), gorgojos Plum curculio, escarabajo japonés, chinche, chinche hedionda, saltarillas, cigarrillas periódicas, áfido negro del cerezo.

Para usar en almendra, nuez de haya, nuez de Brasil, nogal blanco, nuez de la India, castaña, chiniquin, avellana (hazelnut), nogal americano, macadamia, nogal (negro e inglés), y nuez pecana, para controlar: larvas de orugas, gusano alfiler, gusano soldado del betabel, gusano

soldado sureño, gusano pirero, gusano cogollero, barrenador europeo del maíz, gusano minador, escarabajo de la papa de Colorado, crismóleidos, saltamontes, saltarilla, áfido, mosca blanca, cigarrilla espumadora, chinche hedionda, chinche, barrenador del tallo, escarabajo ampollador, escarabajo japonés (adulto), gorgojos del género *Listroderes*, escarabajo del pepino (adulto). Para usar en frijol alado, ejotes, ejotes amarillos, trijoles de carita, chicharos de jardín, chicharos verdes y chicharos dulces, para controlar: gusano cortador, gusano verde del trébol, gusano importado de la col, gusano peludo, velveteleaf caterpillar, conchuela del frijol, isoca del maíz, larvas de *Vanessa cardui*, barrenador europeo del maíz, orugas medidoras, gusano cortador del frijol occidental, gusano soldado, gusano pirero, gusano pirero del céreto, oruga defoliadora del frijol, especies de gusanos tejedores, orugas defoliadoras, mariposita amarilla de la alfalfa, barrenador del tallo, escarabajo del pepino (adulto), gusano de la raíz del maíz (adulto), crismóleidos (adulto), escarabajo ampollador, escarabajo de la hoja del frijol, escarabajo japonés (adulto), saltarillas, especies del género *Halticus*, periquito tricornudo, cigarrilla espumadora, chinche hedionda, chinche, saltamontes, trips, áfidos.

Para usar en la lechuga (corazón y hojas) para controlar: gusano medidor de la alfalfa, falsa medidor de la col, gusano importado de la col, gusanos cortadores, gusano peludo, gusano verde del trébol, gusano soldado, gusano soldado del betabel, gusano cogollero, isoca del maíz, barrenador europeo del maíz, crismóleidos, escarabajo japonés (adulto), escarabajo del pepino (adulto), escarabajo ampollador, escarabajo de la hoja del frijol, escarabajo japonés (adulto), saltarillas, especies del género *Halticus*, periquito tricornudo, cigarrilla espumadora, chinche hedionda, chinche, saltamontes, trips, áfidos.

Para usar en la lechuga (corazón y hojas) para controlar: gusano medidor de la alfalfa, falsa medidor de la col, gusano importado de la col, gusanos cortadores, gusano peludo, gusano verde del trébol, gusano soldado, gusano soldado del betabel, gusano cogollero, isoca del maíz, barrenador europeo del maíz, crismóleidos, escarabajo japonés (adulto), escarabajo del pepino (adulto), escarabajo ampollador, escarabajo de la hoja del frijol, escarabajo japonés (adulto), saltarillas, especies del género *Halticus*, periquito tricornudo, cigarrilla espumadora.

CANTIDAD DE DÍAS QUE SE DEBEN ESPERAR ENTRE LA ÚLTIMA APLICACIÓN Y LA COSECHA

HORTALIZAS	IPC
Brócoli, Coles de Bruselas, Col, Brócoli cavalo, Coliflor, Brócoli chino, Col China, Mostaza parda, Colinabo, Lechuga (hojas y corazón)	1
Tomatillo, Chiles (incluyendo el pimiento morrón), Berenjena, Tomatillo rojo y Pepino	5
Cebolla (bulbo), Ajo	14
Maíz (duce y para palomitas)	21
Frijol alado, Ejotes, Ejotes amarillos, Frijoles de carita, Chicharos de jardín, Chicharos verdes y Chicharos dulces	7
Lechuga (hojas y corazón)	1
IPC = Intervalo previo a la cosecha	

ÁRBOLES FRUTALES Y DE NUECES

Mezcle 1.5 onzas líquidas (3 cadas. soperas) en 1 galón de agua y aplique a 300 pies cuadrados. Aplique cuando aparezcan los insectos o cuando ocurra daño. Rocié para mojar todas las superficies de las plantas infestadas.

En árboles frutales no aplique más de nueve veces por año, y aplique sólo cinco veces después del florcimiento. En árboles de nueces no aplique más de seis veces por año, y aplique sólo cinco veces después del florcimiento.

Para usar en manzano, manzano silvestre, nispero, mayhaw, peral asiático, peral y membrillo, para controlar: saltarillas, polilla, palomilla de las yemas del manzano, cítrida, grapholita prunivora, gusano verde del fruto, especies de lagartas (gusanos tenderos), minador punteado, mosca de la manzana (adulta), minador punteado, gorgojos Plum curculio, escarabajo japonés, chinche, chinche hedionda, saltarilla, cigarrillas periódicas, áfido del manzano, áfido rosado del manzano, psílido del peral, piollo de San José (sólo en frutos).

Para usar en chabacano, cerezo dulce, cerezo agrio, naranja, durazno, ciruelo (*Chickasaw*, *Damson*, *Japanés*), ciruela y ciruelas pasa para controlar: larvas de orugas, anarsia, cítrida, polilla de los melocotoneros, gusano verde del fruto, lagartas (gusanos tenderos), *American plum borer*, mosca de la cereza (adulta), gorgojos Plum curculio, rosa chafer, escarabajo japonés, chinche, chinche hedionda, saltarillas, cigarrillas periódicas, áfido negro del cerezo.

Para usar en almendra, nuez de haya, nuez de Brasil, nogal blanco, nuez de la India, castaña, chiniquin, avellana (hazelnut), nogal americano, macadamia, nogal (negro e inglés), y nuez pecana, para controlar: larvas de orugas, gusano alfiler, gusano soldado del betabel, gusano

PRECAUTIONARY STATEMENTS

Hazards to Humans and Domestic Animals

CAUTION. Harmful if swallowed. Wash hands thoroughly with soap and water after handling and before eating, drinking, chewing gum, using tobacco or using the toilet.

FIRST AID

If Swallowed: Call a Poison Control Center or doctor immediately for treatment advice. Have person sip a glass of water if able to swallow. Do not induce vomiting unless told to do so by a Poison Control Center or doctor. Do not give anything by mouth to an unconscious person. Have the product container or label with you when calling a Poison Control Center or doctor for treatment advice.

Environmental Hazards

This product is extremely toxic to fish. To protect the environment, do not allow pesticide to enter or run off into storm drains, drainage ditches, gutters or surface waters. Applying this product in calm weather when rain is not predicted for the next 24 hours will help to ensure that wind or rain does not blow or wash pesticide off the treatment area. Rinsing application equipment over the treated area will help avoid runoff to water bodies or drainage systems. Drift and runoff from treated areas may be hazardous to aquatic organisms in neighboring areas.

This product is highly toxic to bees exposed to direct treatment or residues on blooming crops or weeds. Do not apply this product or allow it to drift to blooming crops or weeds if bees are visiting the treatment area.

NOTICE: To the extent consistent with applicable law, buyer assumes all responsibility for safety and use not in accordance with directions.

Questions & Comments? Call 1-800-917-5438 or visit our website at www.spectracide.com

DECLARACIONES PREVENTIVAS

Riesgos para los seres humanos y los animales domésticos

PRECAUCIÓN. Nocivo si se ingiere. Lávese muy bien las manos con agua y jabón después de manipularlo y antes de comer, beber, masticar chicle, usar tabaco o usar el baño.

PRIMEROS AUXILIOS

Si se ingiere: Llame inmediatamente a un centro de control de envenenamientos o a un médico para recibir instrucciones de tratamiento. Si la persona puede tragar, haga que beba poco a poco un vaso de agua. No induzca el vómito a menos que así se lo indique un centro de control de envenenamientos o un médico. No administre nada por la boca a una persona que haya perdido el conocimiento.

Cuando llame a un centro de control de envenenamientos o a un médico para recibir instrucciones de tratamiento, tenga a la mano el envase o la etiqueta del producto.

Riesgos para el medio ambiente

Este producto es extremadamente tóxico para los peces. Para proteger el medio ambiente, no permita que el pesticida entre o escorra en alcantarillas pluviales, zanjas de drenaje, cunetas ni agua de superficie. Aplicar este producto cuando el clima está tranquilo y no se pronostique lluvia dentro de las siguientes 24 horas asegurará que el pesticida no vuela con el viento o se lave con la lluvia del área tratada. Enjuagar el equipo de aplicación sobre el área tratada ayudará a evitar el escurrimiento a masas de agua o sistemas de drenaje. La deriva y el escurrimiento desde las áreas tratadas pueden resultar peligrosos para los organismos acuáticos de las zonas vecinas.

Este producto es extremadamente tóxico para las abejas que estén expuestas al tratamiento directo o a los residuos que queden en cultivos o malezas en flor. No aplique este producto ni permita que pase a los cultivos o malezas en flor en caso que haya abejas volando por el área tratada.

NOTA: Hasta el grado que sea compatible con la legislación pertinente, el comprador asume toda la responsabilidad para seguridad y uso que no esté de acuerdo con las instrucciones.

¿Preguntas o comentarios? Llame al 1-800-917-5438.

Distributed by Spectrum Group

Division of United Industries Corporation

PO Box 142642, St. Louis, MO 63114-0642

EPA Reg. No. 9688-277-8845

EPA Est. Nos. 9688-MO-1(U), 39609-MO-1(BM)

Circled letter is first letter of lot number.

17-13299 © 2009 UIC