

# BUMPER®-P

## FUNGICIDA MULTIENTERMEDAD

Asociación de fungicidas de diferente modo de acción ideal para su uso en cereal y arroz, así como para prevenir resistencias. Su amplio espectro de control y la acción combinada sistémica y de contacto, permite que los tratamientos tempranos aseguren un cultivo más sano, durante más tiempo y un incremento en la producción obtenida.

### APLICACIONES AUTORIZADAS

**Trigo y cebada:** oidio, royas y septoria.

**Remolacha azucarera:** cercospora y oidio.

**Arroz:** piricularia y helmintosporium.

### DOSIS Y MODO DE EMPLEO

Trigo y cebada: 1 - 1,5 l/ha, repitiendo el tratamiento cada 7 - 15 días en caso de que sea necesario.

Remolacha azucarera: 1,25 - 1,5 l/ha, repitiendo el tratamiento cada 15 días en caso de mantenerse las condiciones favorables al desarrollo de la enfermedad.

Arroz: 1,5 l/ha. El momento crítico para la protección del cultivo se sitúa en la aparición de la hoja bandera. Se deberá repetir el tratamiento a intervalos de 15-20 días en caso de mantenerse condiciones favorables para el desarrollo de la enfermedad, con un máximo de dos aplicaciones por campaña. No se realizarán aplicaciones después de la emergencia de la panícula.

### RECOMENDACIONES

Tratar al aparecer los primeros síntomas de las enfermedades.

Mojar cuidadosamente toda la vegetación.

El producto penetra rápidamente en la planta por lo que es suficiente un período de 1-2 horas sin lluvia después de la aplicación.

Tratar cuando haya desaparecido el rocío de las plantas.

No mezclar con productos de reacción fuertemente alcalina.

<b>Composición</b>	Procloraz 40% p/v (400 g/l) Propiconazol 9% p/v (90 g/l)
<b>Formulación</b>	Concentrado Emulsionable (EC)
<b>R.O.P.M.F. n°</b>	22.018
<b>Envasado</b>	5 Litros, 20 Litros
<b>Clasificación</b>	Irritante (Xi), Peligroso para el Medio Ambiente (N) Mamíferos: A Aves: A Peces: B Compatible con abejas



### PLAZO DE SEGURIDAD

Remolacha: 30 días.

Cereales: 60 días.

Arroz: no procede por momento de aplicación.