

inmuna total Se

Vacuna reproductiva



Propiedades

Única vacuna de su tipo que incluye en su fórmula el serovar "Hardjobovis" de *Leptospira*, considerado el principal causante de aborto por leptospirosis.

Composición

Cada dosis contiene:

Suspensión inactivada de: virus de IBR (tipos 1 y 5) y BVD (tipos 1 y 2); *Leptospira* serovares: *canicola*, *grippotyphosa*, *hardjo* cepas: *Hardjoprajitno* y *Hardjobovis*; *pomona*, *tarassovi*, *icterohaemorrhagiae* y *wolffi*; *Campylobacter fetus venerealis*, *Campylobacter fetus biotipo intermedio*, *Campylobacter fetus fetus*.

Selenio (como selenato de sodio): 10 mg
Vehículo c.s.p. 5 ml

Indicaciones

Prevención en bovinos de las enfermedades: Rinotraqueitis Infecciosa Bovina (IBR), Diarrea Viral Bovina (BVD), Leptospirosis y Vibriosis. El Selenio contenido en su fórmula coadyuva a asegurar la respuesta inmunológica a la vacuna.

Dosis y modo de empleo

5 ml. Administrar a partir de los 3 meses de edad. Cuando se administra por primera vez se debe aplicar una segunda dosis a los 21-30 días después de la primera.
Revacunación anual

Registro Sanitario

Ecuador 4A-10220-AGROCALIDAD



Vía de administración

Subcutánea.

Precauciones

Mantener fuera del alcance de los niños
Conservar en refrigeración entre 3 y 8° C.
No congelar.
Agitar suavemente el frasco antes de usar.

En caso de reacción anafiláctica, administrar adrenalina (epinefrina) y un corticoide tipo dexametasona, (en hembras preñadas no administrar corticoides sino flunixin meglumina) y consultar al Médico Veterinario. En caso de animales con antecedentes de reacción anafiláctica, ésta puede evitarse o disminuir su intensidad, mediante la aplicación de un antihistamínico 30 a 45 minutos antes de la vacunación.

Contraindicaciones

No aplicar en animales enfermos, desnutridos o en estado febril. No aplicar en animales menores de 3 meses de edad

Presentación

Frasco x 100 ml (20 dosis)



NUESTRA EXPERIENCIA ES VIDA