

**DENUBIL (10 ampollas bebibles)**  
**Cartonaje exterior que incluye el prospecto autorizado**

**CARA – A**

vía oral

741553 ○ ▲

**DENUBIL**

10 ampollas bebibles de 5 ml

PIERRE FABRE

**CARA – B**

**COMPOSICIÓN**

Composición por ampolla:

L-2-pirrolidona-5-carboxilato de dimetilaminoetanol      0,25 g

Clorhidrato de heptaminol      0,18 g

Etanol [23,26% (v/v)], sacarosa, sacarina sódica, parahidroxibenzoato de metilo (E-218), parahidroxibenzoato de propilo (E-216), rojo cochinilla A (E-124), extracto natural de regaliz, aroma natural de ponche [conteniendo etanol 4,96% (v/v)], ácido fosfórico, sorbitol y agua purificada.

**FORMA FARMACEUTICA Y CONTENIDO DEL ENVASE:**

10 ampollas bebibles de 5 ml

**ACTIVIDAD:** Energizante. Revitalizante. Dinamizante.

**TITULAR:**

PIERRE FABRE IBERICA, S.A.

Ramón Trias Fargas, 7-11 08005 Barcelona

**FABRICANTE:**

PIERRE FABRE MEDICAMENT PRODUCTION

45, Place Abel Gance 92654 Boulogne Cedex (Francia)

**INDICACIONES:** Astenia psíquica y psico-orgánica. Trastornos de la memoria, la atención y la vigilancia. Apatía y depresión consecutivas al uso de tranquilizantes y sedantes.

**CONTRAINDICACIONES:** No se conocen.

**INTERACCIONES:** No se conocen.

**ADVERTENCIAS:**

*Embarazo y lactancia:* No se recomienda.

*Uso en niños:* No se recomienda.

*Uso en ancianos:* Ver posología, con la salvedad de que se recomienda que la toma se efectúe por la tarde y no por la noche.

*Efectos sobre la capacidad de conducción:*

Hasta el momento no se ha detectado ningún efecto.

*Advertencias sobre excipientes:*

Este medicamento contiene 28,22% (v/v) de etanol en volumen final. Cada 5 ml contienen 1,12 g de etanol. **PRECAUCION:** No debe administrarse a niños, embarazadas y pacientes con enfermedad hepática, epilepsia, alcoholismo o daños o lesiones cerebrales. Puede modificar o potenciar el efecto de otros medicamentos. Puede disminuir la capacidad de reacción por lo que se aconseja precaución al conducir y manejar maquinaria peligrosa.

Este medicamento contiene 1 g de sorbitol como excipiente por 5 ml. Puede causar molestias de estómago y diarrea. No debe utilizarse en pacientes con intolerancia hereditaria a la fructosa.

Este medicamento contiene rojo cochinilla A como excipiente. Puede causar reacciones de tipo alérgico, incluido asma especialmente en pacientes alérgicos al ácido acetil salicílico.

**POSOLOGIA:** 2 ó 3 ampollas al día, tomadas en medio vaso de agua antes de las comidas.

**SOBREDOSIS:** Debido al amplio margen de seguridad que existe entre la dosis terapéutica y la tóxica no es posible la aparición de efectos nocivos ni con la ingestión masiva del contenido de un envase.

En caso de sobredosis o ingestión accidental consultar al Servicio de Información Toxicológica. Teléfono (91) 562 04 20.

**INSTRUCCIONES PARA LA CORRECTA ADMINISTRACION DEL PREPARADO:** Para evitar el derramamiento de líquido, recomendamos el siguiente modo de empleo: 1º cortar una punta de la ampolla. 2º Después, manteniendo la ampolla en posición vertical sobre el vaso, con la punta cortada hacia abajo, cortar la otra punta.

**REACCIONES ADVERSAS:** No se han descrito pero si se produce cualquier reacción adversa achacable a la toma del medicamento, consulte a su médico o farmacéutico.

**CADUCIDAD:** Este medicamento no se debe utilizar después de la fecha de caducidad indicada en el envase.

**OTRAS PRESENTACIONES:** DENUBIL 20 ampollas bebibles de 5 ml.

**TEXTO REVISADO:** Noviembre 1999.

ASSS

PIERRE FABRE IBERICA, S.A.

DENUBIL 10 AMPOLLAS BEBIBLES

C.N. 741553

(Código de barras)

Con receta médica.

Manténgase fuera del alcance de los niños.



**Pierre Fabre**

**CARAS - C y D**

**DENUBIL**

**CARA - E**

**DENUBIL**

LOT:

CAD:

PVP:

PVP IVA 4

**CARA - F**

**DENUBIL**

**DENUBIL (20 ampollas bebibles)**  
**Cartonaje exterior que incluye el prospecto autorizado**

**CARA – A**

vía oral

741561 ○ ▲

**DENUBIL**

20 ampollas bebibles de 5 ml

PIERRE FABRE

**CARA – B**

**COMPOSICIÓN**

Composición por ampolla:

L-2-pirrolidona-5-carboxilato de dimetilaminoetanol      0,25 g

Clorhidrato de heptaminol      0,18 g

Etanol [23,26% (v/v)], sacarosa, sacarina sódica, parahidroxibenzoato de metilo (E-218), parahidroxibenzoato de propilo (E-216), rojo cochinilla A (E-124), extracto natural de regaliz, aroma natural de ponche [conteniendo etanol 4,96% (v/v)], ácido fosfórico, sorbitol y agua purificada.

**FORMA FARMACEUTICA Y CONTENIDO DEL ENVASE:**

20 ampollas bebibles de 5 ml

**ACTIVIDAD:** Energizante. Revitalizante. Dinamizante.

**TITULAR:**

PIERRE FABRE IBERICA, S.A.

Ramón Trias Fargas, 7-11 08005 Barcelona

**FABRICANTE:**

PIERRE FABRE MEDICAMENT PRODUCTION

45, Place Abel Gance 92654 Boulogne Cedex (Francia)

**INDICACIONES:** Astenia psíquica y psico-orgánica. Trastornos de la memoria, la atención y la vigilancia. Apatía y depresión consecutivas al uso de tranquilizantes y sedantes.

**CONTRAINDICACIONES:** No se conocen.

**INTERACCIONES:** No se conocen.

**ADVERTENCIAS:**

*Embarazo y lactancia:* No se recomienda.

*Uso en niños:* No se recomienda.

*Uso en ancianos:* Ver posología, con la salvedad de que se recomienda que la toma se efectúe por la tarde y no por la noche.

*Efectos sobre la capacidad de conducción:*

Hasta el momento no se ha detectado ningún efecto.

*Advertencias sobre excipientes:*

Este medicamento contiene 28,22% (v/v) de etanol en volumen final. Cada 5 ml contienen 1,12 g de etanol. **PRECAUCION:** No debe administrarse a niños, embarazadas y pacientes con enfermedad hepática, epilepsia, alcoholismo o daños o lesiones cerebrales. Puede modificar o potenciar el efecto de otros medicamentos. Puede disminuir la capacidad de reacción por lo que se aconseja precaución al conducir y manejar maquinaria peligrosa.

Este medicamento contiene 1 g de sorbitol como excipiente por 5 ml. Puede causar molestias de estómago y diarrea. No debe utilizarse en pacientes con intolerancia hereditaria a la fructosa.

Este medicamento contiene rojo cochinilla A como excipiente. Puede causar reacciones de tipo alérgico, incluido asma especialmente en pacientes alérgicos al ácido acetil salicílico.

**POSOLOGIA:** 2 ó 3 ampollas al día, tomadas en medio vaso de agua antes de las comidas.

**SOBREDOSIS:** Debido al amplio margen de seguridad que existe entre la dosis terapéutica y la tóxica no es posible la aparición de efectos nocivos ni con la ingestión masiva del contenido de un envase.

En caso de sobredosis o ingestión accidental consultar al Servicio de Información Toxicológica. Teléfono (91) 562 04 20.

**INSTRUCCIONES PARA LA CORRECTA ADMINISTRACION DEL PREPARADO:** Para evitar el derramamiento de líquido, recomendamos el siguiente modo de empleo: 1º cortar una punta de la ampolla. 2º Después, manteniendo la ampolla en posición vertical sobre el vaso, con la punta cortada hacia abajo, cortar la otra punta.

**REACCIONES ADVERSAS:** No se han descrito pero si se produce cualquier reacción adversa achacable a la toma del medicamento, consulte a su médico o farmacéutico.

**CADUCIDAD:** Este medicamento no se debe utilizar después de la fecha de caducidad indicada en el envase.

**OTRAS PRESENTACIONES:** DENUBIL 10 ampollas bebibles de 5 ml.

**TEXTO REVISADO:** Noviembre 1999.

ASSS

PIERRE FABRE IBERICA, S.A.

DENUBIL 20 AMPOLLAS BEBIBLES

C.N. 741561

(Código de barras)

Con receta médica.

Manténgase fuera del alcance de los niños.



**Pierre Fabre**

**CARA - C**

**DENUBIL**

**CARA - D**

**DENUBIL**

LOT:

CAD:

PVP:

PVP IVA 4

Para abrir alzar la lengüeta

**CARA S- E y F**

**DENUBIL**