

HERBOLEX[®]

INDUSTRIAL

HERBICIDA SISTÉMICO NO RESIDUAL

Herbicida no selectivo de acción sistémica; destruye totalmente las malas hierbas, ya sean anuales o perennes. Se absorbe por las hojas, y la savia lo transporta hasta las raíces, bulbos y rizomas más profundos.

Composición	Glifosato 36% p/v (360 g/l)
Formulación	Concentrado Soluble (SL)
R.O.P.M.F. n°	19.231
Envasado	10 Litros
Clasificación	Irritante (Xi), Peligroso para el Medio Ambiente (N) Mamíferos: A Aves: A Peces: B

APLICACIONES AUTORIZADAS

Tratamientos herbicidas en:

Áreas Industriales (centrales eléctricas, fábricas industriales, aeropuertos, etc.) y **redes viarias y de servicios** (vías férreas, caminos, márgenes de carreteras, etc.), contra malas hierbas anuales y perennes en postemergencia de las mismas.

Canales de riego y drenaje, en zonas pantanosas sin agua corriente, contra malas hierbas emergidas. En aplicación acuática se mantendrá el agua estancada durante los 7 días siguientes a la aplicación.

NORMAS GENERALES DE APLICACIÓN

a) Malas hierbas: Es absorbido únicamente a través de los tejidos verdes, por lo que se deberá tratar cuando las malas hierbas estén bien desarrolladas y en pleno movimiento de savia.

Hierbas anuales: Tratar en cualquier época de su desarrollo, vigilar que no queden sin mojar hierbas poco desarrolladas o de porte rastrero.

Hierbas vivaces: Tratar cuando estén próximas a la floración.

Plantas leñosas: En general deben tratarse al final del período de vegetación, cuando se inicia la inversión de savia.

b) Condiciones climáticas: Tratar con buen tiempo y sin viento. Una lluvia o riego por aspersión antes de las 12 horas siguientes a la aplicación puede reducir la eficacia.

c) Cultivos: No mojar las hojas ni otros tejidos verdes no lignificados de los cultivos colindantes.

d) Producto: Respetar las dosis y épocas indicadas en función de la flora a destruir. No mezclar con otros productos no recomendados. El agua y la maquinaria de aplicación que se utilice deberán estar limpios.

e) Mezclas: Se puede mezclar con la mayoría de los herbicidas residuales normalmente empleados. Consultar con nuestro Servicio Técnico.

MODO DE EMPLEO

Aplicar en pulverización a baja presión, de forma homogénea sobre las malas hierbas.

DOSIS DE EMPLEO

FLORA A DESTRUIR	TIPO DE TRATAMIENTO		
	Ultra bajo volumen pulverizadores Micron-Herbi, Jucos, Geno y aplicadores por contacto. Gasto de caldo: 20 l/ha	Pulverizadores clásicos de mochila o motor. Gasto de caldo: 400-600 l/ha. A todo terreno	Por rodales
Hierbas anuales en general.	150 - 300 cc/l	3 - 6 l/ha	7,5 - 10 cc/l
Hierbas vivaces o perennes como grama, juncia, correguíela, cañota, carrizos, helechos, zarzas, etc...	300 - 600 cc/l	6 - 12 l/ha	15 - 20 cc/l

PRECAUCIONES

No aplicar, mezclar o almacenar HERBOLEX INDUSTRIAL en depósitos o tanques de pulverización galvanizados o de acero sin revestir, por el peligro de reacción con tales materiales. No dejar el caldo de pulverización durante largos períodos de tiempo en el tanque y asegurarse de que éste está bien ventilado.

PLAZO DE SEGURIDAD

Para mejorar la efectividad del producto, es recomendable que no entre el ganado hasta 7 días después del tratamiento.