

GOLEN

Canplus®

PACK AVENICIDA, compuesto de:

2 x 5 litros de TRALKOXIDIM 25 SC (Herbicida selectivo para cereal)
+ 6 x 1 litros de CANPLUS (Mojante)

TRALKOXIDIM 25 SC es un herbicida de postemergencia para el control de avena loca (*Avena* sp), vallico (*Lolium* sp) y otras gramíneas, en cultivos de **trigo, cebada y triticale**. Se caracteriza por una rápida absorción por las malas hierbas, seguido a los pocos días de una parada de su crecimiento, a continuación clorosis de las mismas y por último su necrosis.

MOMENTO DE APLICACIÓN

Usar únicamente en aplicaciones antes del espigado. Debe ser aplicado mezclado con Canplus, con el cultivo y las malas hierbas en buen estado de crecimiento. En el momento de la aplicación, la Avena loca debe estar entre el comienzo del ahijamiento y el estado de dos nudos. El trigo entre la terminación de ahijamiento y el estado de dos nudos. La cebada entre el comienzo del ahijamiento y el estado de dos nudos.

DOSIS Y MODO DE EMPLEO

Trigo: Aplicar a la terminación de ahijamiento y estado de dos nudos 1,2-1,6 l/ha + 0,3% de Canplus (equivalente a 900 cc/ha).

Cebada: Aplicar al comienzo del ahijamiento y estado de dos nudos 1,2- 1,6 l/ha + 0,3% de Canplus (equivalente a 900 cc/ha).

Triticale: aplicar a 1,2-1,6 l/ha + 0,3% de Canplus (equivalente a 900 cc/ha).

La variación de la dosis dependerá del grado de infestación de malas hierbas y condiciones climatológicas. El uso del mojante Canplus es totalmente necesario y en ningún caso se excederá de 1 l/ha.

Equipo terrestre: Llenar de agua hasta la mitad el tanque de pulverizar. A continuación poner en marcha el agitador y añadir el producto y Canplus, seguir echando agua hasta llenar el depósito.

La cantidad de agua por ha. debe estar comprendida entre los 200-300 litros. La presión no será inferior a 2,5 atmósferas y la máquina estará provista de boquillas de abanico plano. Con cantidades de agua inferiores, se corre el peligro de no ser mojadas todas las malas hierbas, y por tanto obtener controles irregulares.

PLAZO DE SEGURIDAD

15 días.

Para la siembra de cereales: 3 meses.

Composición	Tralkoxidim 25% p/v (250 g/l) + Aceite mineral parafínico 60% p/p (600 g/kg) Oleato de sorbitol etoxilado 24% p/p (240 g/kg) Tridecil alcohol etoxilado 12% p/p (120 g/kg)
Formulación	Suspensión Concentrada (SC) + Líquido Oleomiscible (OL)
R.O.P.M.F. n°	19.315 y 19.316
Envasado	2 x 5 Litros de TRALKOXIDIM 25 SC + 6 x 1 Litros de CANPLUS
Clasificación	Nocivo (Xn) + Irritante (Xi) Peligroso para el Medio Ambiente (N), Mamíferos: A Aves: A Peces: B

CANPLUS es una formulación para ser empleada como coadyuvante en caldos de herbicidas.

Se caracteriza por favorecer la adherencia, así como la penetración y actuación de los herbicidas.

APLICACIONES AUTORIZADAS

Todas las especies vegetales

DOSIS Y MODO DE EMPLEO

Se usará en mezcla con el herbicida TRALKOXIDIM 25 SC, siendo 0,9 l/ha la dosis recomendada de CANPLUS.

En caso de aplicar TRALKOXIDIM 25 SC en mezcla con algún herbicida recomendado de espectro complementario, como Brioxil Super, la dosis de CANPLUS será de 0,75 l/ha.

OBSERVACIONES

Utilizar solamente con aquellos herbicidas en que en su etiqueta aparezca recomendado Canplus.

PLAZO DE SEGURIDAD

No procede.

