

## FICHA TÉCNICA

**NOMBRE DEL PRODUCTO**

Maneor 40 semillas®

**CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO**

Fungicida polivalente preventivo para el tratamiento de semillas que actúa por contacto y es activo contra numerosas enfermedades: alternaria, antracnosis, cercospora, mildiu, moniliosis, moteado, royas, septoria y otras enfermedades producidas por hongos endoparásitos. Resultan efectivas en el control preventivo, mediante el tratamiento de la simiente, de enfermedades producidas por endoparásitos cuya infección tiene lugar durante la germinación y primeras etapas del crecimiento del cultivo.

**Nº DE REGISTRO:**

17.821.

**COMPOSICIÓN:**

Maneb 40% (FS) P/V.

**FORMULACIÓN:**

Suspensión concentrada para tratamiento de semillas (FS).

**PRESENTACIÓN:**

Envase de 25, 200 y 1.000 L.

**MODO DE ACCIÓN****Información técnica**

MATERIA ACTIVA	RECOMENDACIONES
Ditiocarbamato con actividad fungicida, de amplio campo de acción sobre enfermedades producidas por hongos endoparásitos; se le reconoce cierta acción acaricida. Inhibe la acción de las enzimas sulfhidríticas en general y de la cisteína en particular. Pertenece al grupo de los inhibidores multisitio.	Aplique homogéneamente sobre semillas con maquinaria tipo Slurry sin diluir o mediante maquinaria adecuada diluyendo la dosis en 500-1.000 cc de agua (2'5-3'5 cc/kg de semilla diluidos en 10 cc de agua).

# MANEOR 40 SEMILLAS

## MODO DE EMPLEO

CULTIVO Y BENEFICIO	DOSIS	P.S.	L.M.R.
<b>Simiente de cereales.</b> Controla enfermedades como carbón vestido, fusarium, pitium, rinosporium y septoria.	250- 350 cc/Qm	N.P.	0,05-2

Plazo de seguridad (P.S.): No procede (N.P.)

**LMR:** Límites máximos de plaguicidas para los productos destinados a la alimentación humana o animal. (mg/kg).

*Los LMRs recogidos en esta tabla son los vigentes a la fecha de revisión indicada en el documento. Para información actualizada consultar la página oficial de la UE: [http://ec.europa.eu/sanco\\_pesticides/public/index.cfm](http://ec.europa.eu/sanco_pesticides/public/index.cfm)*

## CONSEJOS DE USO Y PRECAUCIONES:

Aplique en pulverización a la dosis indicada o su equivalente si se utiliza una técnica de tratamiento distinta de la pulverización.

Aplicar homogéneamente sobre semillas en maquinaria “tipo Slurry” sin diluir o mediante maquinaria adecuada diluyendo la dosis en 0,5-1 l. de agua/Qm. de semilla.

En la etiqueta se advertirá que los sacos o envases en que se expendan las semillas tratadas deberán llevar rotulado o en una etiqueta el texto siguiente: “Semilla desinfectada con manebl, inhabilitada para el consumo, destinarse exclusivamente para siembra”. El producto estará adicionado de cantidad suficiente de colorante para distinguir las semillas tratadas.

Almacenar evitando la humedad, y a temperaturas que no estén debajo de -15°C o más de +40°C.

Uso reservado a aplicadores y agricultores profesionales. Antes de utilizar el producto, léase detenidamente la etiqueta. Respetar las dosis, condiciones y precauciones de uso, leer la etiqueta del producto antes de usarlo. A la hora de realizar un tratamiento, tomar en cuenta las condiciones de su cultivo (tipo de suelo, presión de plaga o enfermedad, variedad, desarrollo vegetativo, estado del cultivo, resistencias) para optimizar el tratamiento. Para limitar la aparición de resistencias, alternar con otros fungicidas con distinto tipo de acción.

Las recomendaciones e información que facilitamos son fruto de amplios y rigurosos estudios y ensayos. Sin embargo, en la utilización pueden intervenir numerosos factores que escapan a nuestro control (preparación de mezclas, aplicación, climatología, etc.). La Compañía garantiza la composición, formulación y contenido. El usuario será responsable de los daños causados (falta de eficacia, toxicidad en general, residuos, etc.) por inobservancia total o parcial de las instrucciones de la etiqueta.