

Neo-bacitrin® 0,5% Polvo



Para uso tópico

PROPIEDADES

NEO-BACITRIN® es una asociación de Neomicina-Bacitracina cuyas principales características son:

- a) Amplio campo de acción, por los espectros complementarios de sus componentes, NEO-BACITRIN® actúa sobre los gérmenes gram-positivos y gram-negativos.
- b) Intenso poder bactericida.
- c) Capacidad alergizante prácticamente nula.
- d) Porcentaje mínimo de casos de resistencia bacteriana.

INDICACIONES

Heridas quirúrgicas y traumáticas. Ulceras de decúbito. Quemaduras. Gangrenas. Ulceras varicosas. Impétigos y eczemas impetiginizados. Acné.

CONTRAINDICACIONES

Hipersensibilidad a la neomicina y/o bacitracina.

INCOMPATIBILIDADES

No existen.

EFFECTOS SECUNDARIOS

Solamente en casos excepcionales pueden producirse reacciones de hipersensibilidad a la neomicina o a la bacitracina.

INTOXICACIÓN Y TRATAMIENTO

En caso de sobredosis o ingestión accidental, consultar al Servicio de Información Toxicológica. Teléfono (91) 562 04 20.

COMPOSICIÓN POR GRAMO

Neomicina (D.C.I.) sulfato	5 mg
(equivalente en base a 3,5 mg)	
Bacitracina (D.C.I.)	500 UI
Almidón de Patata	

PRESENTACIÓN

Envase con 10 g de polvo.

MODO DE EMPLEO

NEO-BACITRIN® POLVO es para uso exclusivamente local. La aplicación se hará con la frecuencia que el médico crea conveniente (generalmente 3-4 veces al día) o cada vez que se renueve la cura.

Otras formas

NEO-BACITRIN® POMADA y NEO-BACITRIN® HIDROCORTISONA

CON RECETA MÉDICA

LOS MEDICAMENTOS DEBEN MANTENERSE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

Neo-bacitrin® 1% Polvo



Para uso tópico

La asociación neomicina-bacitracina (NEO-BACITRIN®) constituye la más ventajosa medicina tópica antiinfecciosa.

Sus principales características son:

- a) Amplio campo de acción, por los espectros complementarios de sus componentes, NEO-BACITRIN® actúa sobre los gérmenes gram-positivos y gram-negativos.
- b) Intenso poder bactericida.
- c) Capacidad alergizante prácticamente nula.
- d) Porcentaje mínimo de casos de resistencia bacteriana.

INDICACIONES

Heridas quirúrgicas y traumáticas. Ulceras de decúbito. Quemaduras. Gangrenas. Ulceras varicosas. Impétigos y eczemas impetiginizados. Acné.

CONTRAINDICACIONES

Hipersensibilidad a la neomicina y/o bacitracina.

INCOMPATIBILIDADES

No existen.

EFFECTOS SECUNDARIOS

Solamente en casos excepcionales pueden producirse reacciones de hipersensibilidad a la neomicina o a la bacitracina.

INTOXICACIÓN Y TRATAMIENTO

En caso de sobredosis o ingestión accidental, consultar al Servicio de Información Toxicológica. Teléfono (91) 562 04 20.

COMPOSICIÓN POR GRAMO

Neomicina (D.C.I.) sulfato	10 mg
(equivalente en base a 7 mg)	
Bacitracina (D.C.I.)	1000 UI
Almidón de Patata	

PRESENTACIÓN

Envase con 50 g de polvo.

MODO DE EMPLEO

NEO-BACITRIN® POLVO es para uso exclusivamente local. La aplicación se hará con la frecuencia que el médico crea conveniente (generalmente 3-4 veces al día) o cada vez que se renueve la cura.

Otras formas

NEO-BACITRIN® POMADA y NEO-BACITRIN® HIDROCORTISONA

CON RECETA MÉDICA

LOS MEDICAMENTOS DEBEN MANTENERSE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS