

**LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO**  
“MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE  
DE LOS NIÑOS”

**MEDIDAS RELATIVAS A LA SEGURIDAD:**

**PRECAUCIONES:** Causa irritación moderada a los ojos. **NO COMER, BEBER O FUMAR** mientras se manipula el producto. **EVITAR** ingerir, inhalar, o tener contacto con la boca y los ojos. **USAR** ropa protectora durante el manipuleo. Después de usar el producto **CÁMBIESE, LAVE LA ROPA** contaminada y **BÁÑESE** con abundante agua y jabón.

**MEDIDAS RELATIVAS A PRIMEROS AUXILIOS:** En caso de intoxicaciones por: **INHALACIÓN:** Remueva a la víctima de la exposición. Remueva la ropa contaminada, permita al paciente asumir una posición más confortable y manténgalo caliente. Mantenga en descanso hasta que se recupere completamente. **CONTACTO DERMAL:** Remueva inmediatamente la ropa contaminada y lave con abundante agua y jabón el sitio contaminado. **CONTACTO OCULAR:** Lave los ojos con abundante agua. **INGESTIÓN:** Lave inmediatamente la boca con agua. Induzca al vómito de a beber agua. No administrar leche, alcohol y sustancias grasas.

**SÍNTOMAS:** No tiene síntomas conocidos. **TRATAMIENTO Y ANTÍDOTO:** El tratamiento es esencialmente sintomático. No existe antídoto específico.

**MEDIDAS RELATIVAS A LA ELIMINACIÓN DE LOS ENVASES:** Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo triturándolo o perforándolo y posteriormente entréguelo a su distribuidor para la incineración según las regulaciones locales

**MEDIDAS RELATIVAS A LA PRESERVACIÓN DEL AMBIENTE:** “Conservar el producto en su envase original etiquetado y cerrado herméticamente, lejos de las bebidas y de los alimentos para las personas y los animales”. “No emplear este envase para ningún otro fin”. “No contaminar ríos, lagos, estanques o fuentes de agua, tanto al lavar los equipos de aspersión como al eliminar los residuos”

Para mayor información dirjase al distribuidor local o el importador especificado en la sección media de esta etiqueta, o comuníquese a:

Teléfono para atención de emergencias toxicológicas: **CIATOX en Quito: (02) 2 900 355, (02) 290 5162 o 1800 VENENO (1800 836366); o CITOX en Guayaquil al (04) 2 451 022.**

Asesor médico del importador: 0999399182

**CORRIDABUL**®

**INSECTICIDA AGRÍCOLA**

**SUSPENSIÓN CONCENTRADA (SC)**

**Ingredientes:**

Diflubenzuron, i.a..... 480 g/l  
Excipientes..... 520 g/l

**Registro Nacional: 064-I 2 / NA**

Número de lote:  
Fecha de formulación:  
Fecha de vencimiento:

**CONTENIDO NETO: 1 LITRO**

**P.V.P.: USD**

**Fabricado por:**  
Zenith Crop Sciences  
Bulgaria LTD

Calle Solunska No 58  
B, entr. B. piso 1, ap.  
1, Sofia 1000. Bulgaria

**Titular del Registro e**

**Importador:**  
AGRISEC ECUADOR S.A.

Av. República 700 y La Pradera  
Edif. María Victoria, piso 1, Of.  
107, Quito - Ecuador  
Tel.: (02) 254-3581  
Correo electrónico:  
[info@agrise.com](mailto:info@agrise.com)  
Página web:  
[www.agrise.com](http://www.agrise.com)

**Distribuido por:**

**MODO DE EMPLEO:** CORRIDABUL, insecticida con acción de contacto y estomacal, perteneciente al grupo químico Benzoil urea. Para su uso recomienda agitar vigorosamente el recipiente original del producto antes de verterlo al tanque de mezcla o premezcla. Cuando es poca cantidad la que se va a aplicar (2 o 3 bombas) se recomienda hacer la mezcla necesaria de Corridabul

requerida para cada bomba y para cada una preparar una premezcla, en un recipiente pequeño agitarla y luego agregarla a la bomba. Cuando es bastante cantidad, ésta se puede preparar un tanque grande, conociendo cuantas bombas pueden llenarse con ese volumen y allí preparar la mezcla, y cada vez que finalice el contenido de una bomba, regresar a llenar otra, hasta que termine el contenido del barril. Usar guantes, mascarilla, ropa de mangas largas y botas impermeables.

**“CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO”**

**INSTRUCCIONES DE USO**

CULTIVO	PLAGA	DOSIS
Papa ( <i>Solanum tuberosum</i> )	Gusano blanco ( <i>Premnotrypes vorax</i> )	175 ml /200 l agua
Palma Africana ( <i>Elaeis guineensis</i> )	Barrenador de raíces ( <i>Sagalassa valida</i> )	1,00 ml/palma en 2 litros de agua

**ÉPOCA Y FRECUENCIA DE APLICACIÓN:**

**Papa:** para manejo de gusano blanco, realizar 3 aplicaciones de CORRIDABUL a los 40, 60 y 80 días a partir de la siembra.

**Palma africana:** para control del “barrenador de las raíces” aplicar CORRIDABUL en frecuencias de 0, 21, 42 días, cuando en prácticas de monitoreo se compruebe el daño inicial de la plaga.

**PERÍODO DE REINGRESO:**

Ingresar al área tratada 12 horas después de la aplicación.

**COMPATIBILIDAD:**

No es compatible con compuestos azufrados y mezclas bordelés.


**PERIODO DE CARENIA:**

Tanto para PAPA como para PALMA AFRICANA, cosechar 14 días después de la última aplicación.

**FITOTOXICIDAD:** No fitotóxico en las condiciones indicadas

**AVISO AL COMPRADOR:** “El titular del registro garantiza, que la características fisicoquímicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.” Norma Andina.

**CATEGORÍA TOXICOLÓGICA: III Ligeramente peligroso**



**CUIDADO**

