

REDOXC 200 mg/ml Gotas orales en solución

Vitamina C (Ácido Ascórbico)

COMPOSICIÓN

Cada ml de solución gotas al 20% de Redoxon contiene 200 mg de vitamina C (=ácido ascórbico) (DCI), metil parahidroxibenzoato, propil parahidroxibenzoato, glicerol, sacarina sódica, hidróxido sódico, aroma de caramelo 12.25.4124, concentrado de caramelo, esencia de ciruela claudia, aroma de naranja D y agua desmineralizada. Un ml corresponde aproximadamente a 20 gotas, es decir que una gota contiene, aproximadamente 10 mg de vitamina C.

PROPIEDADES GENERALES

El organismo humano necesita diariamente la Vitamina C (ácido ascórbico) a todas las edades. Esta vitamina es de gran importancia puesto que interviene en numerosos procesos del organismo, particularmente en relación con la formación de colágeno, la proteína que constituye la membrana basal de los capilares, las fibras del tejido conjuntivo y la matriz orgánica de los tejidos duros, como el hueso y el diente.

INDICACIONES

Prevención de estados carenciales de vitamina C.

Aunque la dieta habitual es rica en ácido ascórbico y cubre las necesidades de esta vitamina, sin embargo, en algunos casos como úlcera péptica, hipertiroidismo, diarrea crónica, embarazo, tabaquismo, uso de anticonceptivos hormonales y estados de malnutrición que no pueden corregirse con la dieta (ej. pacientes bajo regímenes dietéticos), puede ser necesario un mayor aporte de vitamina C.

DOSIS Y MODO DE EMPLEO

Como norma general se tomarán 5 a 20 gotas (según edad del niño), una o dos veces al día, preferiblemente por la mañana o primeras horas de la tarde (hasta el anochecer). Los adultos que eventualmente prefieran esta forma a los comprimidos masticables, tomarán 20-50 gotas una o dos veces al día.

Las gotas podrán tomarse con agua, jugos de frutas, alimentos, bebidas refrescantes, etc., según preferencias.

Uso del frasco cuentagotas: el dispositivo del que va provisto el frasco facilita la dosificación adecuada. Póngase el frasco verticalmente con la abertura hacia abajo. Si la solución no gotea enseguida, agítese o golpéese ligeramente el frasco con la mano o inviértase varias veces.

CONTRAINDICACIONES

En condiciones normales no necesitan administrarse, en el embarazo, dosis superiores a los 100 mg al día y, en cualquier caso, siempre por indicación del médico. Aunque no hay evidencia de efectos perjudiciales, la seguridad fetal de las dosis altas de vitamina C no ha sido establecida.

EFFECTOS SECUNDARIOS

Las dosis superiores a 1 g por día pueden producir diarrea, cálculos renales y calambres abdominales.

Asimismo existe el riesgo de formación de cálculos y de precipitar ataques agudos de gota en individuos predispuestos.

INTERACCIONES

La vitamina C en dosis altas, puede modificar la acción de ciertos medicamentos. Consulte a su médico o farmacéutico si está tomando antidepresivos, anticoagulantes, dosis altas de salicilatos, sulfamidas, trimetoprim/sulfametoxazol, o anticonceptivos hormonales.

PRECAUCIONES

No deben tomarse dosis altas en el embarazo (Ver apartado CONTRAINDICACIONES).

Los pacientes con historia de formación de cálculos o gota deberán consultar a su médico antes de tomar este medicamento.

ADVERTENCIA

Si está utilizando este medicamento, las pruebas de glucosa en orina, incluyendo las pruebas por tiras reactivas pueden dar resultados erróneos, lo que deberá ser tenido en cuenta por pacientes diabéticos.

Advertencia sobre excipientes

Este medicamento por contener glicerol como excipiente puede ser perjudicial a dosis elevadas. Puede provocar dolor de cabeza, molestias de estómago y diarrea.

CONSERVACIÓN

Conserve el frasco bien cerrado y en posición vertical, protegido del calor.

SOBREDOSIS

En caso de ingestión accidental de grandes cantidades, acuda al médico o llame al Servicio de Información Toxicológica, teléfono 91-562 04 20, indicando el producto y la cantidad ingerida.

PRESENTACIÓN

Envase con 20 ml de solución gotas (1 ml=200 mg)

Otras presentaciones de Redoxc:

Envase con 30 comprimidos masticables de 500 mg.

IMPORTANTE PARA LA MUJER

Si está usted embarazada o cree que pudiera estarlo, consulte a su médico antes de tomar este medicamento. El consumo de medicamentos durante el embarazo puede ser peligroso para el embrión o el feto y debe ser vigilado por su médico.

Los medicamentos deben mantenerse fuera del alcance de los niños.

Sin receta médica.

TITULAR

BAYER HISPANIA, S.L.
Av. Baix Llobregat, 3-5
08970 Sant Joan Despí (Barcelona)

FABRICANTE

ROCHE, S.p.A.
Via Morelli, 2
I-20090 Segrate, Milán (Italia)